



Tuberculosis Comparación:( Cierre 2002 /Cierre 2003 )

INDICADORES 1.-Cobertura de Detección 2.-Diagnóstico Oportuno  
3.-Curación 4.-Seguimiento Adecuado  
5.-Productividad de los Laboratorios

Estado	Cierre 2002	Cierre 2003
Nayarit	79.8	91.2
Tamaulipas	76.9	83.6
Morelos	55.4	82.9
Tabasco	74.5	82.7
Michoacán	57.9	78.7
Querétaro	81.2	77.8
Campeche	78.4	77.5
Tlaxcala	44.4	77.1
México	43.9	76.8
Aguascalientes	71.5	75.7
Baja California Sur	78.4	73.8
Veracruz	77.6	73.1
Durango	78.1	72.9
Zacatecas	59.6	71.8
Hidalgo	78.2	70.3
Guerrero	76.0	70.0
Colima	72.0	68.9
San Luis Potosí	70.6	65.7
Guanajuato	57.1	65.2
Sonora	60.2	63.6
Distrito Federal	65.2	62.8
Jalisco	61.5	61.7
Coahuila	66.6	61.0
Yucatán	52.8	60.4
Chihuahua	53.3	59.9
Oaxaca	54.9	57.8
Baja California	57.3	56.2
Quintana Roo	68.9	55.8
Puebla	62.1	55.2
Sinaloa	68.9	44.9
Chiapas	63.9	39.2
Nuevo León	48.9	37.4
Nacional	62.6	63.0



Vector Diferencia entre Cierre 2002 /Cierre 2003					
1	2	3	4	5	Magnitud
5.4	3.8	1.8	0.2	4.9	8.4
7.6	-1.0	0.6	0.0	-0.1	7.7
10.6	1.4	5.9	7.9	0.6	14.6
6.5	3.4	-0.9	0.5	1.3	7.5
6.5	2.6	8.2	1.3	1.9	11.0
6.6	1.6	-4.6	-2.3	-0.2	8.5
8.4	2.5	-4.8	-3.9	0.2	10.7
7.1	2.8	12.6	6.1	-0.8	16.0
4.8	0.4	11.2	10.4	0.1	16.0
3.2	6.1	-3.0	1.8	-1.3	7.8
0.7	0.0	-2.6	-1.9	-0.6	3.3
4.0	2.1	-3.2	-2.6	-1.0	6.2
1.0	0.9	-2.3	-3.4	-0.6	4.4
4.7	0.6	3.0	2.3	-0.2	6.1
2.1	2.2	-8.3	-1.2	-0.5	8.9
0.0	1.3	-6.1	-0.4	-0.4	6.3
5.2	5.7	-10.0	0.8	-0.5	12.7
7.3	1.3	-7.2	0.0	-0.5	10.3
12.1	3.9	-3.9	-0.3	0.1	13.3
8.3	-2.9	-4.1	0.6	-0.2	9.7
4.5	1.8	-7.1	2.1	-0.3	8.9
4.4	0.3	-5.3	3.6	-0.7	7.8
3.1	3.1	-4.9	-0.8	-0.3	6.6
6.4	0.2	-1.2	1.2	-1.4	6.8
5.9	-2.4	0.5	0.3	-1.0	6.5
5.8	0.7	-2.6	1.7	1.7	6.8
4.7	-2.3	-2.1	0.6	0.0	5.7
4.0	-5.3	-9.2	-5.0	0.4	12.4
5.4	0.5	-4.6	-2.9	-0.2	7.7
0.9	0.2	-13.6	-6.8	-2.4	15.4
2.0	0.8	-13.0	-4.7	0.3	14.0
3.3	-1.4	-5.9	-4.9	-0.2	8.5
6.5	0.9	-3.8	-0.7	0.1	7.6