SECRETARÍA DE SALUD | SSA

Panorama Epidemiológico del VIH/SIDA e ITS en México

Consejo Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA

Cuadro 1

Personas infectadas por el VIH, según entidad federativa

México, 1995-2001

Entidad Federativa	Personas infectadas con VIH (1995-2000)	Personas infectada con VIH (2001)
Aguascalientes	69	19
Baja California	557	171
Baja California Sur	67	30
Campeche	91	47
Coahuila de Zaragoza	208	10
Colima	106	22
Chiapas	297	156
Chihuahua	474	160
Distrito Federal	2,599	545
Durango	107	25
Guanajuato	318	82
Guerrero	845	114
Hidalgo	80	33
Jalisco	632	278
México	1,144	211
Michoacán	347	168
Morelos	196	54
Nayarit	223	31
Nuevo León	743	150
Oaxaca	415	164
Puebla	514	212
Querétaro	56	26
Quintana Roo	459	116
San Luis Potosí	133	23
Sinaloa	364	90
Sonora	317	62
Tabasco	241	45
Tamaulipas	416	169
Tlaxcala	58	21
Veracruz	1,344	280
Yucatán	472	177
Zacatecas	90	30
Nacional*	13,982	3,721

(*) El total nacional no incluye extranjeros en tránsito por México.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. SUIVE.

Cuadro 2

Casos de SIDA por año de notificación y año de diagnóstico

México, 1983-2001

Año	Casos de SIDA por año de notificación	Casos de SIDA por año de diagnóstico
1983	6	60
1984	6	198
1985	29	349
1986	246	673
1987	518	1485
1988	905	2069
1989	1605	2661
1990	2587	3517
1991	3155	3625
1992	3210	3988
1993	5058	3950
1994	4111	4129
1995	4310	4268
1996	4216	4437
1997	3670	4201*
1998	4758	4258*
1999	4372	4000*
2000	4855	2874*
2001	4297	1172*
1983-2001**	51,914	51,914

(*) Estas cifras son provisionales, debido a que el retraso en la notificación de casos ocasiona que los casos diagnósticados sean notificados uno o varios años después.

(**) En el total de casos acumulados, así como las cifras de cada año, se incluyen los casos de extranjeros en tránsito por México.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Cuadro 3

Casos nuevos y acumulados de SIDA, según grupos de población

México, 1983-2001

Grupo de Población*	Casos diagnosticados en el año 2001		Casos acumulados (1983-2000)	
	Número	%	Número	%
Menores de 15 años	20	1.7	1,217	2.4
Hombres adultos	975	83.3	42,088	84.1
Mujeres adultas	176	15.0	6,744	13.5
Edad desconocida**	1	(0.09)	693	(1.4)
Total	1,172	100.0	50,742	100.0

(*) Se utilizó el criterio internacional que distingue los casos de SIDA pediátricos (menores de 15 años de edad) de los casos de SIDA en población adulta (hombres y mujeres de 15 ó más años de edad).

(**) Los casos de SIDA de edad desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Cuadro 4

Casos nuevos y acumulados de SIDA en menores de 15 años, según categoría de transmisión

México, 1983-2001

Categoría de transmisión*	Casos diagnosticados en el año 2001		Casos acumulados (1983-2000)	
	Número	%	Número	%
Perinatal	18	100.0	653	69.5
Transmisión sanguínea	0	0.0	258	27.5
Transmisión sexual	0	0.0	28	3.0
Se desconoce**	2	(10.0)	278	(22.8)
Total	20	100.0	1,217	100.0

(*) Se utilizó la clasificación agrupada de factores de riesgo, que corresponde a las vías de transmisión del SIDA (sexual, sanguínea y perinatal).

(**) Los casos de SIDA con categoría de transmisión desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud.

Fuente: SSA. Direccción General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Cuadro 5

Casos nuevos y acumulados de SIDA en personas de 15 años y más, según categoría de transmisión

México, 1983-2001

Categoría de transmisión*	Casos diagnosticados en el año 2001		Casos acumulados (1983-2000)	
	Número	%	Número	%
Transmisión sexual	**1,089**	**99.9**	**29,010**	**89.8**
Homosexual	244	22.4	10,374	32.1
Bisexual	218	20.0	7,263	22.5
Heterosexual	627	57.5	11,373	35.2
Transmisión sanguínea	**1**	**0.1**	**3,100**	**9.6**
Receptor de Transfusión Sanguínea		0.0	2,265	7.0
Hemofílico		0.0	174	0.5
Donador remunerado		0.0	374	1.2
Usuario de drogas inyectables (UDI)	1	0.1	279	0.9
Exp. Ocupacional		0.0	8	0.0
Otras (Homosexual/UDI)	**0**	**0.0**	**197**	**0.6**
Se desconoce**	61	(5.3)	16,525	(33.8)
Total	**1,151**	**100.0**	**48,832**	**100.0**

(*) Se utilizó la clasificación agrupada de factores de riesgo, que corresponde a las vías de transmisión del SIDA en adultos (sexual, sanguínea y combinada), cada una de ellas desglosada en categorías específicas. Se emplearon las siguientes abreviaturaa: HSH (hombres que tienen sexo con hombres) y UDI (usuarios de drogas inyectables).

(**) Los casos de SIDA con categoría de transmisión desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud. .

Fuente: SSA. Direccción General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Cuadro 6

Casos nuevos y acumulados de SIDA, según institución notificante

México, 1983-2001

Institución*	Casos diagnosticados en el año 2001		Casos acumulados (1983-2000)	
	Número	%	Número	%
SSA	770	65.7	26,094	51.4
IMSS		22.8	15,077	29.7
ISSSTE	31	2.6	2,889	5.7
Otras Inst Gobierno	104	8.9	6,682	13.2
OSC	nd	nd	nd	nd
Privadas	nd	nd	nd	nd
TOTAL	1,172	100.0	50,742	100.0

(*) Los casos de SIDA se clasificaron considerando las principales instituciones de salud del país: SSA (población abierta, que no tiene seguridad social), IMSS (población que trabaja en empresas privadas o empleados independientes que cotizan directamente) e ISSSTE (población que trabaja para el gobierno federal). Otras instituciones e gobierno descentralizadas (Pemex, Marina, Sedena, etc.). Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Privadas (hospitales, clínicas y médicos privados).

Fuente: SSA. Direccción General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Cuadro 7

Casos nuevos y acumulados de SIDA, según evolución

México, 1983-2001

Evolución*	Casos diagnosticados en		Casos acumulados (1983-2000)	
	Número	%	Número	%
Vivos	824	78.5	19,847	41.5
Muertos	226	21.5	27,930	58.5
Se desconoce**	122	(10.4)	2,965	(5.8)
Total	1,172	100.0	50,742	100.0

(*) Para estblecer la evolución de los casos de SIDA se consideraron las categorías “Vivo”, “Muerto” y “Se desconoce”.

(**) Los casos de SIDA con evolución desconocida fueron excluidos de la suma de porcentajes, sin embargo, dicha cifra se muestra entre paréntesis para conocer su magnitud.

Fuente: SSA. Direccción General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Cuadro 8

Casos de SIDA según entidad federativa

México, 1983-2001

Entidad Federativa	Casos acumulados (1983-2000)	Casos nuevos 2001 *
Aguascalientes	260	20
Baja California	1,726	0
Baja California Sur	300	17
Campeche	283	14
Coahuila	788	30
Colima	202	21
Chiapas	646	0
Chihuahua	855	47
Distrito Federal	11,814	96
Durango	390	11
Guanajuato	1,090	46
Guerrero	1,596	40
Hidalgo	529	32
Jalisco	5,664	27
México	6,081	56
Michoacán	1,658	43
Morelos	1,250	32
Nayarit	588	20
Nuevo León	1,402	56
Oaxaca	1,027	96
Puebla	3,209	112
Querétaro	427	14
Quintana Roo	295	0
San Luis Potosí	512	13
Sinaloa	672	19
Sonora	673	18
Tabasco	413	30
Tamaulipas	1,022	53
Tlaxcala	417	26
Veracruz	3,213	151
Yucatán	1,171	27
Zacatecas	281	3
Extranjeros	288	2
Nacional	50,742	1,172

(*) Por año de diagnóstico.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Registro Nacional de Casos de SIDA.

Cuadro 9

Mortalidad por SIDA, según entidad federativa *

México, 2000**

Entidad Federativa	Defunciones por SIDA	
	Número	Tasa
Aguascalientes	20	0.5
Baja California	267	6.4
Baja California Sur	24	0.6
Campeche	36	0.9
Coahuila de Zaragoza	62	1.5
Colima	20	0.5
Chiapas	132	3.1
Chihuahua	121	2.9
Distrito Federal	630	15
Durango	28	0.7
Guanajuato	115	2.7
Guerrero	143	3.4
Hidalgo	39	0.9
Jalisco	334	8
México	468	11.1
Michoacán	95	2.3
Morelos	90	2.1
Nayarit	40	1
Nuevo León	125	3
Oaxaca	133	3.2
Puebla	208	5
Querétaro	32	0.8
Quintana Roo	72	1.7
San Luis Potosí	40	1
Sinaloa	56	1.3
Sonora	54	1.3
Tabasco	86	2
Tamaulipas	110	2.6
Tlaxcala	25	0.6
Veracruz	482	11.5
Yucatán	80	1.9
Zacatecas	18	0.4
Extanjeros	15	-
Nacional	4,185	4.2

(*) Tasa por 100,000 habitantes.
(**) Últimos datos disponibles

Fuente:DGIED. Secretaría de Salud.

Cuadro 10

Prevalencia de infección por VIH, según grupos con prácticas de riesgo

México, 1999*

Grupos de población	Número de encuestas	Número de ciudades	Pruebas VIH positivas	Prevalencia de infección por VIH**
Hombres que tiene sexo hombres (HSH)	299	2	16	5.4%
Trabajadores del Sexo Comercial (TSC)	60	2	0	0.0%
Usuarios de drogas inyectables (UDI)	819	2	2	0.24%
Hombres reclusos	nd	nd	nd	nd
Trabajadoras del Sexo Comercial (TSC)	1,271	2	3	0.24%
Mujeres reclusas	nd	nd	nd	nd
Mujeres embarazadas	nd	nd	nd	nd

(*) Últimos datos disponibles.

(**) La prevalencia se calcula dividiendo el número de personas que resultaron postivo en la prueba de detección del VIH, entre la población estudiada, multiplicado por cien.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. Encuestas centinela en los diferentes grupos de población.

Cuadro 11

Incidencia de ITS, por entidad federativa*

México, 2000**

Entidad Federativa	Gonorrea	Tasa	Sífilis adquirida	Tasa	Sífilis congénita	Tasa	Herpes Genital	Tasa	Linfogranuloma Venéreo	Tasa	Chancro Blando	Tasa	Virus de Papiloma Humano	Tasa
Aguascalientes	16	1.6	6	0.6	0	0.0	44	4.5	2	0.2	3	0.3	42	4.2
Baja California	58	2.4	92	3.9	6	0.3	179	7.5	7	0.3	11	0.5	429	18.0
Baja California Sur	53	13.1	21	5.2	1	0.2	30	7.4	4	1.0	3	0.7	55	13.6
Campeche	58	8.2	78	11.0	1	0.1	44	6.2	1	0.1	4	0.6	80	11.3
Coahuila de Zaragoza	161	6.8	37	1.6	1	0.0	40	1.7	2	0.1	8	0.3	37	1.6
Colima	26	4.8	19	3.5	0	0.0	90	16.5	1	0.2	8	1.5	82	15.0
Chiapas	319	7.9	112	2.8	3	0.1	534	13.2	32	0.8	158	3.9	107	2.6
Chihuahua	143	4.7	113	3.7	8	0.3	182	5.9	5	0.2	17	0.6	494	16.1
Distrito Federal	66	0.8	53	0.6	3	0.0	261	3.0	2	0.0	6	0.1	1188	13.5
Durango	27	1.8	14	0.9	0	0.0	141	9.2	4	0.3	20	1.3	52	3.4
Guanajuato	26	0.5	29	0.6	0	0.0	120	2.4	5	0.1	11	0.2	85	1.7
Guerrero	249	7.8	168	5.3	3	0.1	413	13.0	10	0.3	35	1.1	859	27.0
Hidalgo	26	1.1	40	1.7	0	0.0	117	5.1	3	0.1	11	0.5	387	16.7
Jalisco	293	4.5	67	1.0	0	0.0	614	9.4	16	0.2	67	1.0	1115	17.1
México	123	0.9	35	0.3	0	0.0	348	2.7	9	0.1	26	0.2	280	2.1
Michoacán	165	3.9	40	0.9	4	0.1	174	4.1	9	0.2	11	0.3	246	5.8
Morelos	19	1.2	10	0.6	1	0.1	281	17.7	6	0.4	33	2.1	199	12.5
Nayarit	286	29.8	35	3.6	1	0.1	164	17.1	6	0.6	23	2.4	275	28.7
Nuevo León	107	2.8	97	2.5	13	0.3	185	4.8	14	0.4	15	0.4	256	6.6
Oaxaca	308	8.6	68	1.9	0	0.0	390	10.9	19	0.5	54	1.5	944	26.3
Puebla	258	5.0	23	0.4	2	0.0	231	4.5	7	0.1	32	0.6	147	2.9
Querétaro	13	0.9	24	1.7	0	0.0	31	2.2	1	0.1	6	0.4	18	1.3
Quintana Roo	91	11.1	66	8.1	0	0.0	132	16.1	5	0.6	3	0.4	268	32.8
San Luis Potosí	112	4.6	7	0.3	1	0.0	114	4.7	3	0.1	5	0.2	292	12.1
Sinaloa	189	7.6	69	2.8	6	0.2	162	6.5	10	0.4	16	0.6	279	11.2
Sonora	183	8.1	82	3.6	3	0.1	116	5.2	14	0.6	9	0.4	75	3.3
Tabasco	204	10.5	50	2.6	3	0.2	244	12.6	8	0.4	22	1.1	161	8.3
Tamaulipas	414	15.1	128	4.7	1	0.0	239	8.7	8	0.3	41	1.5	227	8.3
Tlaxcala	24	2.4	16	1.6	0	0.0	82	8.3	2	0.2	10	1.0	90	9.1
Veracruz	411	5.8	130	1.8	6	0.1	506	7.1	22	0.3	62	0.9	828	11.6
Yucatán	53	3.2	76	4.5	0	0.0	192	11.4	0	0.0	12	0.7	32	1.9
Zacatecas	116	8.0	19	1.3	0	0.0	88	6.1	4	0.3	9	0.6	764	52.7
Nacional	4,597	4.6	1,824	1.8	67	0.1	6,488	6.5	241	0.2	751	0.8	10,393	10.4

(*) Tasa por 100,000 habitantes.
(**) Últimos datos disponibles.

Fuente: SSA. Dirección General de Epidemiología. SUIVE.