

COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD



***CATÁLOGO DE
SERVICIOS
ESENCIALES DE
SALUD (CASES) 2004***

DIRECTORIO

Secretaría de Salud

DR. JULIO FRENK MORA
Secretario de Salud

DR. ENRIQUE RUELAS BARAJAS
Subsecretario de Innovación y Calidad

DR. ROBERTO TAPIA CONYER
Subsecretario de Prevención y Protección de la Salud

LIC. MARÍA EUGENIA DE LEÓN - MAY
Subsecretaria de Administración y Finanzas

Comisión Nacional de Protección Social en Salud

ACT. JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ ORTÍZ
Comisionado Nacional de Protección Social en Salud

DR. ANGEL GIOVANNI DE LUNA NOYOLA
Director General de Gestión de Servicios de Salud

Grupo de Trabajo

DR. EMILIO HERRERA BASTO
Director de Prestaciones Médicas

DR. FRANCISCO SANTILLÁN VÉLEZ
Director de Administración de Riesgos

DR. HUMBERTO MACIEL HERNÁNDEZ
Subdirector del Sistema de Atención Médica

DR. CARLOS ÁLVAREZ LUCAS
Director General Adjunto de Programas Preventivos
Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud

INTRODUCCIÓN

La Protección Social en Salud, de acuerdo a la Ley General de Salud vigente, es un mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones, de promoción a la salud, prevención diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) complementa los servicios de salud dirigidos a la comunidad, así como aquellos servicios personales con beneficios a terceros que forman parte de los programas de Salud Pública.

El diseño del Catálogo de Servicios Esenciales de Salud (CASES) se basó en criterios epidemiológicos donde se estima que las intervenciones seleccionadas cubren el 90% de la atención médica que se registra en el Sistema Único de Información para Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) y también de lo reportado en el Sistema de Información en Salud para Población Abierta (SISPA). Para los servicios de hospitalización y cirugía, la oferta actual del catálogo cubre el 66% de los principales procedimientos diagnósticos y terapéuticos, reportados como motivo de egreso hospitalario a través el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH).

El procedimiento se basó también en la revisión de las siguientes fuentes: (1) el paquete básico de intervenciones que actualmente se oferta en la SSA bajo el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC), (2) el paquete esencial que extiende el Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) tanto en el área rural, como urbana, (3) aquellas intervenciones incluidas en los programas del nivel federal (Salud del Adulto y Anciano, Salud Reproductiva, Enfermedades Transmitidas por Vector, Micobacteriosis, Salud de la Infancia y la Adolescencia, VIH/SIDA e ITS, Salud Bucal, Accidentes, Cólera y Rabia, Arranque Parejo en la Vida y Promoción a la Salud y que no se duplicaban en los apartados previos, y (4) el paquete familiar del Seguro Popular de Salud.

Todas las intervenciones fueron sujetas a un amplio consenso con diversos grupos de trabajo del Sistema Nacional de Salud; se incorporaron las sugerencias de los equipos de profesionales de aquellos estados que participan en la implementación del PSS y que fueron presentadas durante los "Talleres de Fortalecimiento a la Oferta de Servicios de Salud" el pasado mes de marzo de 2004; finalmente, el CASES fue consensuado con los responsables de los programas federales implicados, en coordinación con la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud.

Las intervenciones seleccionadas se describen en forma explícita para cada uno de los procedimientos de detección, diagnóstico y tratamiento que conforman los conglomerados de servicios que se ofertan en las unidades médicas. La descripción de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos necesarios para cada una de las intervenciones, incluyendo la elaboración de árboles de decisiones en aquellos padecimientos donde fuera posible, permitió establecer las funciones básicas de producción de servicios y reconocer los insumos y recursos para dar atención durante cada intervención.

Se consultaron las normas vigentes, los manuales técnicos de aquellos programas que cuentan con ellos, la literatura médica y los especialistas en el tema. Una interesante innovación de estos servicios es que privilegian la prevención, habiendo incluido acciones como el examen médico anual para adultos, la prevención y promoción de la salud en la línea de vida y la detección de tuberculosis.

El CASES permitió elaborar un listado de medicamentos a los que tienen derecho los afiliados del sistema y los diferentes paquetes permiten elaborar formularios de medicamentos, cuyos costos pueden definirse claramente y facilitan el análisis de los diferentes esquemas de compra en farmacia para la prestación de servicios.

Se incluye el cuadro básico de medicamentos para el primer nivel de atención, clasificado de acuerdo a los grupos establecidos por el Consejo de Salubridad General. Para el segundo nivel de atención el SPSS sólo presenta algunas claves de importancia; ésto debido a que se prefiere incentivar la autonomía de gestión hospitalaria y permitir que los hospitales, con sus comités de adquisición y clínicos, definan cuáles son los insumos y medicamentos más convenientes para el tipo de población y de acuerdo a las intervenciones que atienden.

CATÁLOGO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD

I. Detección y prevención (9)

1. Vacuna oral tipo Sabin
2. Vacuna pentavalente DPT, HB, Hib
3. Vacuna triple viral SRP
4. Vacuna Td
5. Vacuna BCG
6. Detección y diagnóstico de tuberculosis
7. Prevención y promoción de la salud durante la línea de vida
8. Examen físico para mujeres mayores de 40 a 49 años (cada 3 años)
9. Examen físico para hombres mayores de 40 a 49 años (cada 3 años)

II. Medicina Ambulatoria (25)

10. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades exantemáticas de la niñez
11. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la úlcera péptica
12. Diagnóstico y tratamiento de colitis
13. Diagnóstico y tratamiento de parasitosis intestinal
14. Diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas
15. Diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda
16. Diagnóstico y tratamiento de fiebre tifoidea
17. Diagnóstico y tratamiento de la dermatosis simple, celulitis y micosis
18. Diagnóstico y tratamiento de escabiasis y pediculosis
19. Diagnóstico y tratamiento de conjuntivitis
20. Diagnóstico y tratamiento de otitis media aguda
21. Diagnóstico y tratamiento de sinusitis aguda
22. Diagnóstico y tratamiento de infección de vías urinarias
23. Diagnóstico y tratamiento de vulvitis y vaginitis agudas
24. Diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual
25. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de diabetes mellitus 2
26. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de diabetes mellitus 1
27. Diagnóstico y tratamiento del hipertiroidismo
28. Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo congénito
29. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de hipertensión arterial

30. Diagnóstico y tratamiento de gota
31. Diagnóstico y tratamiento de anemia ferropriva
32. Diagnóstico y tratamiento de enfermedad articular degenerativa
33. Diagnóstico y tratamiento del asma en niños
34. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de epilepsia

III. Odontología (3)

35. Prevención de caries
36. Sellado de fosetas y fisuras dentales
37. Eliminación de focos de infección, abscesos y restos radiculares

IV. Salud Reproductiva (6)

38. Método temporal de planificación familiar: dispositivo intrauterino (DIU)
39. Método permanente de planificación familiar: vasectomía
40. Método permanente de planificación familiar: salpingoclasia
41. Diagnóstico y tratamiento de dismenorrea primaria
42. Atención del climaterio y menopausia
43. Clínica de displasias

V. Embarazo, parto y recién nacido (5)

44. Atención del embarazo normal (prenatal)
45. Atención del parto normal y puerperio
46. Atención del recién nacido normal
47. Cesárea y puerperio quirúrgico
48. Estimulación temprana del prematuro

VI. Rehabilitación (2)

49. Rehabilitación de fracturas
50. Rehabilitación de parálisis facial

VII. Urgencias (6)

51. Diagnóstico y tratamiento general de las intoxicaciones
52. Diagnóstico y tratamiento de intoxicación por organofosforados
53. Diagnóstico y tratamiento de mordedura de serpiente

- 54. Diagnóstico y tratamiento del alacranismo
- 55. Manejo de lesiones traumáticas de tejidos blandos
- 56. Manejo de mordeduras y prevención de rabia en humanos

VIII. Hospitalización (9)

- 57. Diagnóstico y tratamiento de pielonefritis
- 58. Diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis
- 59. Diagnóstico y tratamiento de meningitis
- 60. Diagnóstico y tratamiento de neumonía de comunidad en niños
- 61. Diagnóstico y tratamiento de neumonía de comunidad en el adulto mayor
- 62. Diagnóstico y tratamiento del absceso hepático amebiano
- 63. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria
- 64. Diagnóstico y tratamiento del aborto incompleto
- 65. Diagnóstico y tratamiento de la litiasis de vías urinarias

IX. Cirugía General (8)

- 66. Colectomía
- 67. Apendicectomía
- 68. Hernioplastia crural
- 69. Hernioplastia inguinal
- 70. Hernioplastia umbilical
- 71. Hernioplastia ventral
- 72. Diagnóstico y tratamiento del absceso rectal
- 73. Diagnóstico y tratamiento de fístula y fisura anal

X. Cirugía Ginecológica (3)

- 74. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de miomatosis uterina (miomectomía)
- 75. Histerectomía
- 76. Plastia vaginal anterior

XI. Cirugía Urológica (2)

- 77. Prostatectomía abierta
- 78. Resección transuretral de próstata

XII. Cirugía Oftalmológica (3)

- 79. Cirugía de cataratas para uno o ambos ojos (Con extracción y colocación de lente intraocular)
- 80. Cirugía correctiva de estrabismo
- 81. Resección de pterigión

XIII. Cirugía Reconstructiva para Niños (4)

- 82. Cirugía reconstructiva para labio y paladar hendidos
- 83. Diagnóstico y tratamiento de la hipertrofia congénita de píloro
- 84. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico del pie equino
- 85. Diagnóstico y tratamiento de la luxación congénita de cadera

XIV. Traumatología (6)

- 86. Diagnóstico y tratamiento de esguinces en extremidades
- 87. Diagnóstico y tratamiento de fractura de clavícula
- 88. Diagnóstico y tratamiento de fractura de húmero (Con osteosíntesis)
- 89. Diagnóstico y tratamiento fracturas de cúbito y radio (Con osteosíntesis)
- 90. Diagnóstico y tratamiento fracturas de tibia y peroné (Con osteosíntesis)
- 91. Diagnóstico y tratamiento de fracturas diafisiarias de fémur (Con osteosíntesis)

CATÁLOGO EXPLÍCITO

1. Vacuna oral tipo Sabin

(Contra poliomielitis)

Descripción

Se aplica a todo niño menor de cinco años de edad a los dos, cuatro y seis meses de edad y durante las dos primeras Semanas Nacionales de Salud hasta los cuatro años. Deben registrarse las acciones en la Cartilla Nacional de Vacunación.

CIE - 9 - MC

99.41 Administración de vacuna contra la poliomielitis

Normatividad

NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.

Medicamentos

3802 Vacuna Sabin frasco gotero con 20 dosis

2. Vacuna pentavalente DPT, HB, Hib

(Contra difteria, tos ferina, tétanos, hepatitis B e infección invasiva por H. Influenzae b)

Descripción

Se aplica a los 2, 4 y 6 meses de edad y dos dosis de refuerzo con DPT a los 2 y 4 años de edad. Deben registrarse las acciones en la Cartilla Nacional de Vacunación.

CIE - 9 - MC

99.391 Administración de vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib)

Normatividad

NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.

Medicamentos

3823 Vacuna pentavalente unidosis, dos frascos ampula: uno contiene la vacuna contra Haemophilus influenzae b en forma liofilizada, el otro es una suspensión de 0.5 ml de la vacuna DPT y de antígeno de superficie recombinante del virus de la hepatitis B.

3. Vacuna triple viral SRP

(Contra sarampión, rubéola y parotiditis)

Descripción

La vacuna triple viral se aplica a los 12 meses y a los 6 años de edad. Deben registrarse las acciones en la Cartilla Nacional de Vacunación.

CIE - 9 - MC

99.48 Administración de vacuna contra sarampión-parotiditis-rubéola

Normatividad

NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.

Medicamentos

3820 Vacuna triple viral SRP fco. de vacuna liofilizada unidosis acompañada de una ampolleta con diluyente de 0.5 ml

4. Vacuna Td

(Contra difteria y tétanos)

Descripción

La vacuna Td (tipo adulto) se presenta en forma líquida, en frasco ampola de cristal transparente, que corresponde a 0.5 ml cada una. La dosis es de 0.5 ml y se aplica como refuerzo a los niños y niñas a partir de los 12 años de edad. Las personas no vacunadas o con esquema incompleto de vacuna pentavalente o DPT, recibirán al menos dos dosis con intervalo de cuatro a ocho semanas entre cada una y revacunación a los diez años. En las mujeres de 12 a 45 años de edad se deben aplicar dos dosis. Iniciar con una dosis de 0.5 ml y aplicar la segunda dosis con intervalo de 4 a 8 semanas posterior a la primera. La embarazada, si tiene dosis previas, se debe aplicar una dosis por cada embarazo hasta completar cinco dosis y revacunación a los diez años. En el caso de las embarazadas que no cuenten con dosis previas, iniciarán el esquema durante el primer contacto con los servicios de salud o lo más pronto posible durante el embarazo. Deben registrarse las acciones en las Cartillas Nacionales de Salud de acuerdo a la edad y género de la persona.

CIE - 9 - MC

99.391 Administración de vacuna combinada de difteria-tétanos

Normatividad

NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.

Medicamentos

3810 Vacuna Td frasco 5 ml, 10 dosis

5. Vacuna BCG

(Contra tuberculosis)

Descripción

La vacuna se presenta en una ampolleta ámbar de 1 mg de liofilizado (10 dosis) y 1 ampolleta con 1 ml de solución salina isotónica inyectable (diluyente). Existen varios tipos de frascos dependiendo del fabricante. Se aplica a todos los recién nacidos con peso mayor a dos kilogramos o en los menores de 14 años que no hayan sido vacunados o no se compruebe la vacunación. Deben registrarse las acciones en la Cartilla Nacional de Vacunación.

CIE - 9 - MC

99.33 Vacunación contra tuberculosis

Normatividad

NOM-036-SSA2-2002, prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.

Medicamentos

3801 Vacuna BCG ampolleta con 10 dosis.

6. Detección y diagnóstico de tuberculosis

Descripción

La detección se efectúa en la unidad de salud con búsqueda de pacientes sintomáticos (personas mayores de 15 años con tos y expectoración), mediante el estudio de baciloscopia en serie de tres. El cultivo de secreción será aplicado en caso de fracaso o recaída de tratamiento previo. El tratamiento será de acuerdo a la normatividad vigente y estará a cargo del programa estatal correspondiente.

CIE - 10

Z111 Examen de pesquisa especial para tuberculosis respiratoria

Normatividad

NOM-006-SSA2-1993, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud

Auxiliares de diagnóstico

Baciloscopia serie de 3

Cultivo de expectoración

7. Prevención y promoción de la salud durante la línea de vida

Descripción

Esta intervención incluye historia clínica y examen físico completo. Se otorga con la finalidad de proporcionar la Cartilla Nacional de Salud correspondiente a edad y género e iniciar al afiliado en los programas de prevención y promoción a la salud. Las Cartillas de Salud están dirigidas a los cuatro grupos que integran la línea de la vida: (1) niñas, niños y adolescentes, (2) mujeres, (3) hombres y (4) adulto mayor.

CIE - 10

Z 000 Examen médico general

Cartillas

Cartilla Nacional de Salud de las Niñas, Niños y Adolescentes

Cartilla Nacional de Salud de la Mujer de 20 a 59 años de edad

Cartilla Nacional de Salud del Hombre de 20 a 59 años de edad

Cartilla Nacional de Salud del Adulto Mayor

8. Examen físico para mujeres mayores de 40 a 49 años (cada 3 años)

Descripción

El examen físico debe comprender la realización de historia clínica, exploración física completa y detección de enfermedades crónico degenerativas como Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se apoya con exámenes de laboratorio (biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina), y debe completarse con la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer de 20 a 59 años de edad.

CIE - 9 - MC

Z000 Examen médico general

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática

Química sanguínea de 3 elementos

Examen general de orina

9. Examen físico para hombres mayores de 40 a 49 años (cada 3 años)

Descripción

El examen físico debe comprender la realización de historia clínica, exploración física completa y detección de enfermedades crónico degenerativas como Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y Obesidad. Se apoya con exámenes de laboratorio (biometría hemática, química sanguínea y examen general de orina), y debe completarse con la Cartilla Nacional de Salud del Hombre de 20 a 59 años de edad.

CIE - 9 - MC

Z000 Examen médico general

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática

Química sanguínea de 3 elementos

Examen general de orina

10. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades exantemáticas de la niñez

Descripción

Intervención dirigida a niños inmunocompetentes. El diagnóstico se lleva a cabo a través del interrogatorio y la sintomatología, lo que permite hacer el diferencial. Se proporciona tratamiento sintomático y se recomiendan medidas generales.

CIE - 9 - MC

- B019 Varicela
- B059 Sarampión
- B069 Rubéola

Medicamentos

- 104 Paracetamol. Tabletas 500 mg c/20
- 106 Paracetamol. Suspensión 100 mg/ml

11. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la úlcera péptica

Descripción

En la consulta inicial se investigarán factores de riesgo y síntomas de la enfermedad. El diagnóstico se realiza basándose en el cuadro clínico y a través de una serie esófago gastroduodenal y/o endoscopia. Incluye dos consultas de seguimiento con el especialista. Tratamiento sintomático y para infección por *Helicobacter pilory*.

CIE - 10

- K25 Úlcera gástrica
- K26 Úlcera duodenal

Medicamentos

- 1233 Ranitidina tabletas 150 mg, c/100
- 1234 Ranitidina ampolletas 50 mg
- 1207 Butilhioscina grageas 10 mg, c/20
- 1206 Butilhioscina ampolletas
- 1263 Subsalicilato de bismuto suspensión 120 ml, 17.5 g/ml
- 5180 Omeprazol cápsulas 20 mg, c/7
- 1223 Hidróxido de Al y Mg envase c/48 tabletas
- 1224 Hidróxido de Al y Mg frasco 360 ml
- 1971 Eritromicina cápsulas de 250 mg, c/20
- 1972 Eritromicina suspensión 125 mg, 120 ml
- 2128 Amoxicilina cápsulas 500 mg, c/12
- 2127 Amoxicilina suspensión 250 mg
- 1308 Metronidazol tabletas 500 mg
- 1310 Metronidazol suspensión 250 mg
- 2132 Claritromicina Tabletas 250 mg 10 Tabletas

Auxiliares de diagnóstico

- Endoscopia con toma de biopsia
- Serie gastroduodenal (bario)
- Biopsia de mucosa gástrica
- Prueba de ureasa para *H. pilory*
- Histología y cultivo para *H. pilory*

12. Diagnóstico y tratamiento de colitis

Descripción

Incluye una consulta inicial donde se investigará el cuadro clínico y se le realizará exploración física. El diagnóstico se apoya con exámenes de laboratorio como el coproparasitoscópico en serie de tres, biometría hemática y radiografía simple de abdomen. En casos crónicos será necesario realizar ultrasonido abdominal y su derivación al especialista. Se incluyen medicamentos y dos consultas de control.

CIE - 10

K52 Colitis y gastroenteritis no infecciosas
K58 Síndrome de colon irritable

Medicamentos

1241 Metoclopramida. Tabletas de 10 mg, c/20
1207 Butilhioscina. Grageas 10 mg, c/20
1206 Butilhioscina. Ampolletas
1263 Subsalicilato de bismuto. Suspensión 120 ml, 17.5 g/ml
1209 Cisaprida. Tabletas 5 mg, c/30

Auxiliares de diagnóstico

Coproparasitoscópico (3 muestras)
Biometría hemática
Radiografía simple de abdomen
Ultrasonido abdominal

13. Diagnóstico y tratamiento de parasitosis intestinal

Descripción

El diagnóstico se realiza basándose en el cuadro clínico, edad y antecedentes del enfermo. El médico puede prescribir tratamiento anti-parasitario una vez al año incluso sin necesidad de exámenes de laboratorio.

CIE - 10

A06 Amebiasis
A71 Giardiasis (lambliasis)
B65 Equistostomiasis (bilharziasis)
B67 Equinococosis
B68 Teniasis
B74 Filariasis
B75 Triquinosis
B76 Anquilostomiasis y necatoriasis
B77 Ascariasis
B78 Estrongiloidiasis
B79 Tricuriasis
B80 Enterobiasis
B82 Parasitosis intestinales no especificadas

Medicamentos

1310 Metronidazol. Suspensión 250mg/5ml 120ml
1308 Metronidazol. Tabletas 500 mg, c/30
2136 Mebendazol. Tabletas 100 mg, c/6
1345 Albendazol. Frasco 20 mg, 20 mg/ml
1344 Albendazol. Tabletas de 200 mg, c/10
2138 Pamoato de pirantel. Tabletas de 250 mg

Auxiliares de diagnóstico

Coproparasitoscópico

14. Diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas

Descripción

En esta entidad se encuentran incluidas las rinofaringitis, faringitis, laringitis, faringoamigdalitis, epiglotitis, laringotraqueobronquitis. El diagnóstico se realiza basándose en el cuadro clínico los antecedentes epidemiológicos y la exploración física. El cultivo de secreción nasal y el exudado faríngeo son apoyos de laboratorio. El tratamiento promedio es por 7 días y se programa una visita de seguimiento al finalizar el tratamiento.

Normatividad

NOM-031-SSA2-1999 Para la atención a la salud del niño

CIE - 10

- J00 Rinofaringitis aguda (resfriado común)
- J02 Faringitis aguda
- J03 Amigdalitis aguda
- J04 Laringitis y traqueitis agudas

Medicamentos

- 2127 Amoxicilina. Suspensión 250 mg con 75 ml
- 2128 Amoxicilina. Tabletas 500 mg, c/12
- 2129 Amoxicilina con ácido clavulánico. Suspensión 125 mg
- 1972 Eritromicina. Suspensión 125 mg, 120 ml
- 1971 Eritromicina. Cápsulas de 250 mg c/20
- 1924 Penicilina G. Procaínica. Ampolleta 400 000 U
- 1925 Penicilina G. Benzatínica combinada. Ampolleta 1 200 000 U
- 1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12
- 1904 Trimetoprim con sulfametoxazol. Suspensión 120 ml, (40mg/5 ml)
- 1903 Trimetoprim con sulfametoxazol. Tabletas 80 mg, c/30
- 104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20
- 105 Paracetamol. Supositorios 300 mg
- 106 Paracetamol. 100 mg/ml, frasco 15 ml
- 108 Metamizol. Tabletas 500 mg, c/20
- 2144 Loratadina. Tabletas 10 mg, c/20
- 2145 Loratadina. Suspensión c/60 ml

15. Diagnóstico y tratamiento de diarrea aguda

Descripción

Esta intervención consta de cuatro esquemas de tratamiento: (1) diarrea aguda sin deshidratación, (2) diarrea aguda con deshidratación, (3) diarrea aguda con choque por deshidratación y (4) diarrea aguda con sangre (disentería). Se utilizan tres esquemas de tratamiento A, B y C de acuerdo a la NOM y adicionalmente se incluye tratamiento antiparasitario y antinfecioso. En el 2% de los casos y ante la sospecha de cólera, deberá realizarse la detección y su tratamiento profiláctico (no incluye hospitalización).

CIE - 10

- A09 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso

Normatividad

NOM-031-SSA2-1999 para la atención a la salud del niño

Manual de Procedimientos Técnicos de Enfermedades Diarreicas, programa de atención a la salud del niño y adolescente

Manual de Niñas y Niños bien desarrollados

Medicamentos

- 3623 Electrolitos orales. Sobre 27.9 gr
- 1345 Albendazol. Frasco 20 mg, 20 mg/ml

- 1344 Albendazol. Tabletas de 200 mg, c/10
- 1903 Trimetoprim/sulfametoxazol. Tabletas 80 mg, c/30
- 1904 Trimetoprim/sulfametoxazol. Suspensión 120 ml, (40mg/5 ml)
- 106 Paracetamol. Gotas 100 mg/ml, frasco 15 ml
- 104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20
- 1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12
- 1972 Eritromicina. Suspensión 125 mg, 120 ml
- 1971 Eritromicina. Cápsulas de 250 mg c/20
- 1940 Doxiciclina. Cápsulas de 100 mg, c/10
- 3112 Difenidol. Solución inyectable 40 mg
- 3111 Difenidol. Tabletas 25 mg

Auxiliares de diagnóstico

- Leucocitos en heces o moco fecal
- Amiba en fresco
- Prueba de Cary Blair

16. Diagnóstico y tratamiento de fiebre tifoidea

Descripción

El interrogatorio, la exploración física y la presencia de síntomas sugestivos de la enfermedad acompañados por reacciones febriles apoyan el diagnóstico. La intervención incluye el tratamiento médico y consultas subsecuentes de seguimiento.

CIE -10

- A010 Fiebre tifoidea
- A014 Fiebre paratifoidea

Medicamentos

- 1904 Trimetoprim con sulfametoxazol. Suspensión 120 ml, 40mg/5 ml
- 1903 Trimetoprim con sulfametoxazol. Tabletas 80 mg, c/30
- 4255 Ciprofloxacina. Cápsulas de 500 mg c/12
- 5260 Cloramfenicol. Suspensión con 31.25 mg/ ml
- 1991 Cloramfenicol. Cápsulas 250 mg c/20
- 1992 Cloramfenicol. Ampolletas 1 g

Auxiliares de diagnóstico

- Reacciones febriles

17. Diagnóstico y tratamiento de la dermatosis simple, celulitis y micosis

Descripción

Incluye dermatosis virales, reaccionales y eritemo-escamosas, celulitis y micosis superficiales. El diagnóstico se basa en la exploración física de las lesiones, edad y antecedentes. No se incluyen apoyos de laboratorio. El tratamiento depende del tipo de dermatosis y se sugiere por lo menos una consulta de control.

CIE - 10

- L03 Celulitis
- B36 Micosis superficiales
- L20 Dermatitis atópica
- L21 Dermatitis seborreica
- L22 Dermatitis del pañal
- L23 Dermatitis alérgica de contacto
- L24 Dermatitis de contacto por irritantes
- L26 Dermatitis exfoliativa

L30 Otras dermatitis

Medicamentos

910 Aceite de almendras dulces. Crema con 235 ml
804 Óxido de zinc. Pasta de lassar, tubo 30g
408 Clorfeniramina. Jarabe 0.5 mg, frasco 120 ml
872 Clioquinol. Crema, envase 60 g
2144 Loratadina. Tabletas 10 mg, c/20
2145 Loratadina. Suspensión c./60 ml
891 Miconazol. Tubo 20 g

18. Diagnóstico y tratamiento de escabiasis y pediculosis

Descripción

El diagnóstico es clínico, se basa en los antecedentes y la exploración física. El tratamiento depende de cada caso y del grado de infestación. Se incluye una consulta de seguimiento.

CIE - 10

B85 Pediculosis y phthiriasis

B86 Escabiasis

Medicamentos

861 Benzoato de bencilo. Emulsión dérmica 300 mg. 120 ml
408 Clorfeniramina. Jarabe 0.5 mg, frasco 120 ml
872 Clioquinol. Crema, envase 60 g
2144 Loratadina. Tabletas 10 mg, c/20
2145 Loratadina. Suspensión c/60 ml
911 Lindano. Envase de shampoo 1g/100 ml

19. Diagnóstico y tratamiento de conjuntivitis

Descripción

El diagnóstico se efectúa con la exploración física de los ojos. Esta intervención incluye el tratamiento médico y una visita de seguimiento.

CIE - 10

H10 Conjuntivitis

Medicamentos

2821 Cloranfenicol. Gotas oftálmicas con 15 ml
2822 Cloranfenicol. Ungüento oftálmico 5 mg
2823 Neomicina, polimixina B y gramicidina. Solución oftálmica 1.75 mg
2841 Prednisolona . Solución oftálmica 5 ml
4407 Tetracaina. Solución oftálmica 10 ml
2804 Nafazolina. Solución oftálmica 15 ml (1mg/ml)

20. Diagnóstico y tratamiento de otitis media aguda

Descripción

Complicación de una infección de vías aéreas superiores. Para su diagnóstico se incluye una buena anamnesis y exploración física del oído con otoneumoscopia. El tratamiento incluye varios esquemas de tratamiento de acuerdo a la evolución del cuadro clínico durante 10 días y una visita de seguimiento.

Normatividad

NOM-031-SSA2-1999 Para la atención a la salud del niño

CIE - 10

- H 65 Otitis media no supurativa
H 66 Otitis media supurativa y la no especificada

Medicamentos

- 2127 Amoxicilina. Suspensión 250 mg con 75 ml
2128 Amoxicilina. Cápsulas 500 mg, c/12
2129 Amoxicilina/ácido clavulánico. Suspensión 125 mg
1972 Eritromicina. Suspensión 125 mg, 120 ml
1971 Eritromicina. Cápsulas de 250 mg c/20
1904 Trimetoprim/sulfametoxazol. Suspensión 120 ml, 40mg/5 ml
1903 Trimetoprim/sulfametoxazol. Tabletas 80 mg, c/30
1939 Cefalexina. Tabletas 500 mg c/20
104 Paracetamol. Tabletas 500 mg c/20
106 Paracetamol. Suspensión 100 mg/ml

21. Diagnóstico y tratamiento de sinusitis aguda

Descripción

La sinusitis aguda es la inflamación de uno o varios de los senos paranasales. Habitualmente se presenta como una complicación de una infección respiratoria aguda. Los patógenos más comunes son Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y bacterias anaerobias. El diagnóstico incluye un buen interrogatorio y una buena exploración de nariz, oídos, faringe y senos paranasales. Las radiografías de senos paranasales Cadwell, Waters y lateral ayudan al diagnóstico. El tratamiento es a base de antibióticos y se programan dos visitas de seguimiento.

Normatividad

NOM-031-SSA2-1999 Para la atención a la salud del niño

CIE - 10

- J01 Sinusitis aguda

Medicamentos

- 2127 Amoxicilina. Suspensión 250 mg con 75 ml
2128 Amoxicilina. Cápsulas 500 mg, c/12
2129 Amoxicilina / ácido clavulánico. Suspensión 125 mg
1972 Eritromicina. Suspensión 125 mg, 120 ml
1971 Eritromicina. Cápsulas de 250 mg c/20
1904 Trimetoprim/sulfametoxazol. Suspensión 120 ml, 40mg/5 ml
1903 Trimetoprim/sulfametoxazol. Tabletas 80 mg, c/30
1939 Cefalexina. Tabletas 500 mg c/20
104 Paracetamol. Tabletas 500 mg c/20
106 Paracetamol. Suspensión 100 mg/ml

Auxiliares de Diagnóstico

Rx de senos paranasales (Cadwell, Waters y lateral)

22. Diagnóstico y tratamiento de infección de vías urinarias

Descripción

Las infecciones de vías urinarias incluyen uretritis y cistitis. El diagnóstico se realiza por medio del cuadro clínico, exploración física y anamnesis. Como apoyo de laboratorio se solicita un examen general de orina y cultivo de orina. El tratamiento con antibióticos es por 10 días. El diagnóstico puede apoyarse con urocultivo. El tratamiento es con antibióticos durante 10 días.

CIE - 10

- N30 Cistitis
N34 Uretritis y síndrome uretral

Medicamentos

- 1903 Trimetoprim/sulfametoxazol. Tabletas 80 mg, c/30
1904 Trimetoprim/sulfametoxazol. Suspensión 120 ml, (40mg/5 ml)
1911 Nitrofurantoína. Furadantina tabletas 100 mg, c/40
1939 Cefalexina. Tabletas 500 mg, c/20
1954 Gentamicina. Solución inyectable de 80 mg
1955 Gentamicina. Solución inyectable de 20 mg
4255 Ciprofloxacina. Tabletas 500 mg, c/12

Auxiliares de diagnóstico

- Urocultivo
Examen general de orina

23. Diagnóstico y tratamiento de vulvitis y vaginitis agudas

Descripción

El diagnóstico se basa en las características del cuadro clínico y del tipo de flujo. Se complementa con un frotis de exudado y cultivo de secreción vaginal para identificación del agente y tratamiento específico.

CIE - 10

- N760 Vaginitis aguda
N761 Vaginitis subaguda y crónica
N762 Vulvitis aguda

Medicamentos

- 1566 Nistatina. Tabletas vaginales c/28
1561 Metronidazol. 10 Óvulos o tabletas vaginales 500mg
1308 Metronidazol. Tabletas 500 mg, c/30
891 Miconazol. Crema 20g
2024 Isoconazol. Crema 20 g

Auxiliares de diagnóstico

- Frotis de exudado vaginal
Cultivo de exudado cérvico vaginal

24. Diagnóstico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual

(Sífilis, gonorrea, candidosis, clamidia y tricomonas)

Descripción

Incluye sífilis, gonorrea, candidosis, clamidia y tricomonas. El diagnóstico de cada una de estas enfermedades depende de la historia clínica, exploración física y de la prueba de laboratorio indicada en cada caso, se incluyen exámenes de laboratorio, tratamiento y una consulta de seguimiento.

Norma Oficial

NOM -039-SSA2-2002, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual

CIE - 10

- A50 Sífilis congénita
A51 Sífilis precoz
A52 Sífilis tardía
A54 Infección gonocócica
A55 Linfogranuloma venéreo por clamidias
A56 Otras enfermedades de transmisión sexual debidas a clamidias

A59 Tricomoniasis
B37 Candidosis

Medicamentos

2510 Penicilina G. Procaínica. Ampolleta 400 000 U
1921 Penicilina sódica cristalina. Fco. ampula 1 000 000 U
1925 Penicilina G. Benzatínica. Ampolleta 1,200 000 U
1940 Doxiciclina. Cápsulas de 100 mg, c/10
4255 Ciprofloxacina. Cápsulas de 500 mg c/12
1566 Nistatina. Tabletas vaginales c/28
1561 Metronidazol. 10 Óvulos/tabletas vaginales 500mg
1308 Metronidazol. Tabletas 500 mg, c/30
891 Miconazol crema. Tubo 20g, miconazol 20 mg/g
2018 Itraconazol. 15 Cápsulas de 100 mg
1562 Nitrofurazona óvulos 6 mg c/6

Auxiliares de diagnóstico

Cultivo de exudado cérvico vaginal
Cultivo de exudado uretral
Prueba rápida de reagina (RPR) o V.D.R.L.
Prueba de inmunofluorescencia o Prueba F.TAAVS

25. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de diabetes mellitus 2

Descripción

Como prueba diagnóstica se incluyó una glucemia en ayuno y posteriormente una prueba de tolerancia a la glucosa para confirmación del diagnóstico. El tratamiento dependerá de la constitución física del enfermo y de sus cifras de glucemia. Inicialmente se prescribe dieta y ejercicio moderado. Si persiste la glucosa alta se inicia tratamiento farmacológico de acuerdo a los esquemas recomendados. Esta intervención incluye dos consultas iniciales y 4 durante el año para control así mismo glucemia cada 3 meses o hemoglobina glucosilada anual como mínimo. Se ha incluido como opción el uso de insulina de acción prolongada (cadena larga) para pacientes complicados (30% de los casos).

CIE -10

E11 Diabetes mellitus no insulino dependiente

Norma Oficial

NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes

Medicamentos

5165 Metformina. Tabletas de 850 mg, c/30
1042 Glibenclamida. Tabletas 5 mg, c/50
5166 Acarbosa. Tabletas de 100 mg, c/30
1050 Insulina intermedia NPH Frasco 10 ml, 100 U/ml sol.iny
1051 Insulina humana acción rápida regular Frasco 10 ml, 100 U/ml sol.iny (sólo para atención hospitalaria)
4157 Insulina humana de acción lenta Frasco 10 ml, 100 U/ml sol.iny
4158 Insulina glargina (de acción prolongada) 3.64 mg equivalente a 100 UI de insulina humana. Fco 10 ml (para pacientes complicados)

Auxiliares de diagnóstico

Glucosa en sangre
Hemoglobina glucosilada
Examen general de orina
Triglicéridos en sangre
Prueba de tolerancia a la glucosa
Química sanguínea de 3 elementos
Metil etil cetona en orina (cuerpos cetónicos)

Colesterol total en sangre

26. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de diabetes mellitus 1

Descripción

El tratamiento depende de la constitución física del paciente y sus cifras de glucemia. Se incluye tratamiento con insulina de acuerdo a los esquemas recomendados y como opción el uso de insulina de acción prolongada (cadena larga) en casos complicados. Esta intervención incluye dos consultas iniciales, 4 durante el año para control, una interconsulta con el especialista y glucemia cada mes.

CIE -10

E10 Diabetes mellitus insulino dependiente

Norma Oficial

NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes

Medicamentos

1050 Insulina intermedia NPH Frasco 10 ml, 100 U/ml Sol. Inyectable

1051 Insulina humana acción rápida regular Frasco 10 ml, 100 U/ml Sol. Inyectable (sólo para atención hospitalaria)

4157 Insulina humana de acción lenta Frasco 10 ml, 100 U/ml Sol. Inyectable

4158 Insulina glargina (de acción prolongada) 3.64 mg equivalente a 100 UI de insulina humana. Fco 10 ml (para pacientes complicados)

Auxiliares de diagnóstico

Glucosa en sangre

Hemoglobina glucosilada

Examen general de orina

Prueba de tolerancia a la glucosa

Química sanguínea de 3 elementos

Metil etil cetona en orina (cuerpos cetónicos)

Colesterol total en sangre

27. Diagnóstico y tratamiento del hipertiroidismo

Descripción

Más frecuente en mujeres después de los treinta años de edad, es de tipo autoinmune y el diagnóstico se basa en el cuadro clínico con apoyo del laboratorio cada tres meses. Se recomienda tratamiento con antitiroideos durante un año con seguimiento al 1, 2, 3, 6 y 12 meses mediante pruebas de función tiroidea. Incluye interconsulta a oftalmología.

CIE -10

E05 Hipertiroidismo

Medicamentos

530 Propanolol. Tabletas 40 mg, c/20

1022 Tiamazol. Tabletas 5 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

Perfil tiroideo (triyodotironina, tiroxina, tiroxina libre y HET)

Gamagrafía de tiroides

Biometría hemática

Química sanguínea de 3 elementos

Examen general de orina

28. Diagnóstico y tratamiento del hipotiroidismo congénito

Descripción

Antes de la segunda semana de vida se lleva a cabo la prueba de tamizaje. Si es positiva se realizarán exámenes adicionales de hormonas tiroideas, biometría hemática, química sanguínea, colesterol, electrolitos séricos, radiografía de tórax y a juicio del clínico, captación de yodo radioactivo. El tratamiento es hormonal sustitutivo.

CIE -10

E039 Hipotiroidismo congénito

Medicamentos

1007 Levotiroxina. Tabletas de 100 mcg, c/50

Auxiliares de diagnóstico

Prueba para fenilcetonuria e hipotiroidismo (tamiz neonatal)

Biometría hemática

Química sanguínea de 3 elementos

Electrolitos séricos

Gamagrafía de tiroides

Perfil tiroideo (triyodotironina, tiroxina, tiroxina libre y HET)

Rx de tórax (posteroanterior, anteroposterior o lateral)

29. Diagnóstico y tratamiento farmacológico (ambulatorio) de hipertensión arterial

Descripción

La presencia de cifras de presión arterial mayores a 140 mmHg de sistólica o 90 mmHg de diastólica nos hará sospechar de hipertensión arterial. Una vez establecido el diagnóstico y de acuerdo al criterio clínico se recomendará dieta y ejercicio o bien se iniciará tratamiento farmacológico. El seguimiento será cada 1 a 3 meses dependiendo del control y evolución de cada caso.

CIE - 10

Z013 Examen de la presión sanguínea

I10 Hipertensión esencial (primaria)

Normatividad

Proyecto de Norma Oficial Mexicana para la prevención, tratamiento y control de la hipertensión arterial

Medicamentos

561 Clortalidona. Tabletas 50 mg, c/20

2301 Hidroclorotiazida. Tabletas 250 mg, c/20

597 Nifedipino. Tabletas 10 mg, c/24

574 Captopril. Tabletas 25 mg, c/30

2521 Losartán potásico/hidroclorotiazida. Tabletas 50/12.5 mg, c/15

2530 Candesartán/hidroclorotiazida. Tabletas 80/12.5 mg

4097 Irbesartán/hidroclorotiazida. Tabletas 150/12.5 mg

4098 Irbesartán/hidroclorotiazida. Tabletas 300/25 mg

572 Metoprolol. Tabletas 100 mg, c/20

530 Propanolol. Tabletas 40 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática

Colesterol total en sangre

Colesterol en sangre fracciones HDL/LDL

Examen general de orina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrolitos séricos
Rx tórax
Electrocardiograma

30. Diagnóstico y tratamiento de gota

Descripción

El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, los antecedentes hereditarios, los factores de riesgo, la determinación de ácido úrico en sangre y el examen general de orina.

CIE - 10

M10 Gota

Medicamentos

3451 Alopurinol. Tabletas 300 mg, c/20

3409 Colchicina. Tabletas 1 mg, c/60

3413 Indometacina. Cápsulas 25 mg, c/30

Auxiliares de diagnóstico

L-22 Acido úrico en sangre

L-518 Examen general de orina

31. Diagnóstico y tratamiento de anemia ferropriva

Descripción

Más frecuente en mujeres en edad fértil y durante el embarazo. El diagnóstico se basa en la exploración física, sintomatología y apoyos de laboratorio. Se programa una consulta de seguimiento y tratamiento con sulfato ferroso.

CIE - 10

D50 Anemia por deficiencia de hierro

Medicamentos

1701 Fumarato ferroso. Suspensión 2.9 mg/100 ml

1702 Fumarato ferroso. Tabletas 200 mg c/50

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática

Frotis de sangre periférica

32. Diagnóstico y tratamiento de enfermedad articular degenerativa

Descripción

Pertenece al grupo de las enfermedades degenerativas crónicas. Se presenta principalmente después de los 45 años de edad. El diagnóstico es clínico y se confirma con biometría hemática, proteína C reactiva y factor reumatoide.

CIE - 10

M15 Osteoartritis

Medicamentos

3461 Azatioprina. Tabletas 50 mg, c/50

472 Prednisona. Tabletas de 5 mg, c/30

3417 Diclofenaco. Tabletas 75 mg, c/20

5506 Celecoxib. Cápsulas 200 mg, c/10

4031 Capsaicina. Crema 40 g

101 Acido acetilsalicílico. Tabletas de 500 mg con 20

3401 Acido acetilsalicílico. Grageas 500 mg con capa entérica

3413 Indometacina. Cápsulas 25 mg, c/30

Auxiliares de diagnóstico

Rx de mano (dos proyecciones)
Proteína C reactiva
Velocidad de sedimentación globular
Factor reumatoide

33. Diagnóstico y tratamiento del asma en niños

Descripción

El diagnóstico puede apoyarse con espirometría y radiografía de tórax. Otros apoyos incluyen biometría hemática, inmunoglobulina E, coproparasitoscópico seriado, pHmetría y manometría esofágica. El tratamiento incluye diferentes esquemas. Se incluyen sesiones de inhaloterapia y atención en caso de urgencias. Los medicamentos son por un año.

CIE - 10

J45 Asma

Medicamentos

611 Epinefrina (Adrenalina). Solución inyectable 1 mg (1:1000/ ml) 50 Ampolletas con un ml
463 Ketotifeno. Frasco con 120 ml
464 Cromoglicato sódico Aerosol, envase 16 g, 112 disparos
429 Salbutamol. Aerosol 20 mg, c/200 disparos
439 Salbutamol. Solución para nebuliz 5 mg/10 ml
431 Salbutamol. Jarabe 2mg/5ml, frasco 60 ml.
426 Aminofilina. Ampolleta 250 mg, c/5
5075 Teofilina. Frasco 160 ml
2141 Betametasona. Ampolleta 4 mg, 1 ml
477 Beclometasona. Aerosol envase c/200 dosis
2162 Bromuro de ipatropio. Aerosol 10 ml, 200 dosis
4329 Montelukast. Tabletas 5 mg, c/14
4331 Zafirlukast. Tabletas 20 mg, c/28

Auxiliares de diagnóstico

Rx de tórax (posteroanterior, anteroposterior o lateral)
Espirometría
Frotis de expectoración
Biometría hemática
Inmunoglobulina E sérica
Coproparasitoscópico (3 muestras)

34. Diagnóstico y tratamiento farmacológico de epilepsia

Descripción

El diagnóstico etiológico de esta enfermedad se realiza por exclusión. Incluye electroencefalograma y a criterio del clínico, tomografía axial computarizada y resonancia magnética nuclear.

CIE - 10

G40 Epilepsia

Medicamentos

2611 Fenitoína. Suspensión 37.5mg/5m
0525 Fenitoína. Tabletas 100 mg, c/50
2608 Carbamazepina. Tabletas 200 mg, c/20
2609 Carbamazepina. Suspensión 120 ml, 20 mg/ml
2601 Fenobarbital. Comprimidos 50 mg, c/30

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática
Química sanguínea de 3 elementos
Electrolitos séricos
Electroencefalograma (EEG)

Tomografía axial computarizada de cráneo sin contraste
Tomografía axial computarizada de cráneo con contraste
Resonancia magnética nuclear cráneo (RMN)

35. Prevención de caries

(Profilaxis, odontoxesis y aplicación tópica de flúor)

Descripción

Incluye odontoxesis, que es el pulido y limpieza de los dientes por medio de procedimientos mecánicos, que se realizan en el consultorio dental eliminando cálculo (sarro), manchas extrínsecas y placa dentobacteriana. Después de ello, para la aplicación tópica de flúor, se utiliza fluoruro de sodio al 2%, fluoruro estañoso al 8% o fluoruro de fosfato acidulado con 1.23% de fluoruro. Se lleva a cabo dos veces por año para reducir el deterioro dental hasta en un 40%. Las acciones deben registrarse en las Cartillas Nacionales de Salud de acuerdo a la edad y género de la persona.

Normatividad

NOM -013-SSA2-1994 Para la prevención y control de enfermedades bucales

CIE 10

Z012 Examen odontológico

36. Sellado de fosetas y fisuras dentales

Descripción

Consiste en la aplicación de polímeros capaces de adherirse a la estructura dental para sellar las áreas susceptibles de caries. Se realiza principalmente en los grupos de riesgo: menores de 14 años, mujeres embarazadas, pacientes diabéticos y adultos mayores.

CIE 10

K02 Caries dental

Normatividad

NOM -013-SSA2-1994 Para la prevención y control de enfermedades bucales

37. Eliminación de focos de infección, abscesos y restos radiculares

Descripción

Incluye el tratamiento del proceso infeccioso bucal, drenaje de abscesos, extracción de piezas dentales y extracción de restos radiculares (se incluyen erupcionados).

Normatividad

NOM -013-SSA2-1994 Para la prevención y control de enfermedades bucales

CIE 10

K02 Caries dental

K05 Gingivitis y periodontitis

Medicamentos

1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12

1929 Ampicilina Tabletas o cápsulas 500 mg 20 tabletas o cápsulas

104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

Rx dental (vista única)

38. Método temporal de planificación familiar: dispositivo intrauterino (DIU)

Descripción

Se requiere de una visita médica para su aplicación, la segunda entre la cuarta y sexta semana posterior a la inserción, otra a los seis meses de la misma y posteriormente cada año. La efectividad del dispositivo tipo T Cu 380 A es de hasta 10 años, para multiload 375 y 250, y el que contiene progesterona es de tres a cinco años.

Normatividad

NOM-005-SS2-1993, de los servicios de planificación familiar

CIE 10

Z301 Inserción de dispositivo anticonceptivo (intrauterino)

39. Método permanente de planificación familiar: vasectomía

Descripción

La vasectomía es una cirugía sencilla que no necesita quirófano y cuyo período de recuperación no precisa de estancia hospitalaria. Es suficiente contar con un espacio aséptico para su realización. No se necesitan estudios preoperatorios si el solicitante está sano. Se incluyen tres espermatoconteos y tres visitas médicas posteriores para evaluar la herida quirúrgica, la evolución de la intervención y la eficacia del procedimiento.

Normatividad

NOM-005-SS2-1993, de los servicios de planificación familiar

CIE - 9 - MC

63.73 Vasectomía

Medicamentos

3407 Naproxeno. Tabletas 275 mg, c/20

104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

Grupo sanguíneo y Rh

Examen general de orina

Biometría hemática

Química sanguínea de 3 elementos

Tiempo de protombina

Tiempo de tromboplastina parcial

Espermatobioscopia

40. Método permanente de planificación familiar: salpingoclasia

(Oclusión tubaria bilateral)

Descripción

Método permanente de planificación familiar que consiste en la ligadura y corte de trompas de Falopio. Los exámenes prequirúrgicos incluyen tiempo de coagulación, química sanguínea, biometría hemática, general de orina, electrocardiograma (ECG) y valoración cardiológica. El procedimiento se realiza con anestesia epidural (bloqueo), se consideró en promedio una hora de quirófano, estancia corta por doce horas y una consulta posterior para revisión.

Normatividad

NOM-005-SS2-1993, de los servicios de planificación familiar

CIE - 10

Z300 Consejo y asesoramiento general sobre la anticoncepción

Z302 Esterilización

CIE - 9 - MC

66.3 Oclusión bilateral de las trompas de Falopio

Medicamentos

- 3417 Diclofenaco. 20 tabletas 75 mg
- 108 Metamizol. Tabletas de 500 mg
- 109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)
- 104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

- Grupo sanguíneo y Rh
- Biometría hemática
- Tiempo de protombina
- Tiempo de tromboplastina parcial
- Electrocardiograma (ECG)

41. Diagnóstico y tratamiento de dismenorrea primaria

El diagnóstico es clínico y el tratamiento a base de analgésicos orales y parenterales. Pueden incluirse exámenes simples como biometría hemática y examen general de orina. El ultrasonido se aplica en casos especiales a juicio del clínico.

CIE 10

- N944 Dismenorrea primaria

Medicamentos

- 1206 Butilhioscina tabletas 10 mg, c/20
- 1207 Butilhioscina ampolleta 20 mg 1 ml, c/3
- 3417 Diclofenaco tabletas 75 mg, c/20
- 3407 Naproxeno tabletas 275 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

- Biometría hemática
- Examen general de orina
- Ultrasonido pélvico

42. Atención del climaterio y menopausia

Descripción

El climaterio y la menopausia es una fase de la vida normal de la mujer, se le debe realizar historia clínica y una buena exploración física, dentro de los estudios de laboratorio se encuentra la citología cervical (para tinción de Papanicolaou) que contemple una calidad de la muestra adecuada con el material específico (cepillo endocervical o citobrush), perfil hormonal y densitometría si se sospecha decalcificación ósea. El tratamiento es hormonal sustitutivo, ejercicio, calcio y apoyo psicológico.

CIE - 10

- N951 Menopausia y trastornos postmenopáusicos

Medicamentos

- 1501 Estrógenos conjugados 42 grageas 1.25 mg
- 1502 Estrógenos conjugados 42 grageas 0.625 mg
- 1006 Calcio 500 mg comprimidos efervescentes. Caja con 12 comp.

Auxiliares de diagnóstico

- Densitometría ósea
- Citología cervical (tinción de Papanicolaou)
- Perfil hormonal en la mujer

43. Clínica de displasias

(Diagnóstico y tratamiento)

Descripción

Servicio especializado en diagnóstico y tratamiento de lesiones cervicales premalignas o displasias (cáncer in situ). Ante la presencia de una citología cervical (tinción de Papanicolaou) con reporte de Virus del Papiloma Humano (VPH) o displasia leve (Lesión de Bajo Grado, LIBG) se realizará un estudio colposcópico para descartar lesión y si se confirma esta evidencia, se tomará biopsia; en caso contrario se vigilará colposcópicamente cada seis meses durante veinticuatro meses a fin de permitir su remisión. Ante reporte de citología cervical con displasia moderada, grave o cáncer in situ (Lesión de Alto Grado, LIAG) se realizará estudio colposcópico para confirmación diagnóstica por biopsia o conización cervical. El tratamiento específico, el seguimiento y la vigilancia epidemiológica se realizará de acuerdo al apéndice normativo de la NOM-014-SSA2-1994. A criterio del médico tratante, el tratamiento comprende fármacos, electrocirugía (90% de los casos) y/o criocirugía (10% de los casos) Las consultas de seguimiento están programadas a los 2, 4 y 6 meses.

CIE - 10

- N870 Displasia cervical leve (NIC-I)
- N871 Displasia cervical moderada (NIC-II)
- N872 Displasia cervical severa (NIC-III)
- N879 Displasia cervical no especificada
- D06 Carcinoma in situ del cuello del útero

Medicamentos

- 1562 Nitrofurazona. Óvulos 6 mg, c/6
- 874 Nitrofurazona. Pomada 2 mg/ g, envase con 436 ó 85 g
- 2191 Vitamina A Cápsulas 50 000 UI, 40 Cápsulas
- 1561 Metronidazol. Óvulos vaginales de 500 mg c/10
- 1308 Metronidazol. Tabletas 500 mg, c/30
- 3407 Naproxeno. Tabletas 275 mg, c/20
- 1903 Trimetoprim con sulfametoxazol. Tabletas 80 mg, c/30
- 1940 Doxiciclina. Tabletas 100 mg, c/10
- 1973 Clindamicina. Solución inyectable 300 mg/ 2 ml. Una ampollita con 2 ml
- 2133 Clindamicina. Cápsulas 300 mg 16 cápsulas

Auxiliares de diagnóstico y tratamiento

- Colposcopia
- Biopsia de cérvix
- Conización cervical
- Citología cervical (tinción de Papanicolaou)

44. Atención del embarazo normal (prenatal)

Descripción

Incluye el diagnóstico mediante una prueba inmunológica y seguimiento prenatal de acuerdo al cuadro que se muestra abajo. Los exámenes de laboratorio incluyen biometría hemática, química sanguínea, examen de orina, VDRL, tipo sanguíneo y para mujeres de alto riesgo prueba de VIH. Los diagnósticos asociados con alto riesgo (obesidad, eclampsia, diabetes, placenta previa, retraso de crecimiento uterino y otros) se refieren al especialista. La cardiotocografía y el ultrasonido se aplican en casos especiales a juicio del clínico. Debe disponerse de hidralazina ante la posibilidad de complicaciones (15% de los casos).

CIE 10

- Z32 Examen y prueba del embarazo
- Z34 Supervisión de embarazo normal

Normatividad

NOM-007-SSA2-1993, Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio a recién nacidos. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio

<i>Cons prenatales de acuerdo a la NOM 007 SSA 2 - 1993</i>	
1a. Consulta	En el transcurso de las primeras 12 semanas
2a. Consulta	Entre la 22 - 24 semanas de gestación
3a. Consulta	Entre la 27 - 29 semanas de gestación
4a. Consulta	Entre la 33 - 35 semanas de gestación
5a. Consulta	Entre la 38 - 40 semanas de gestación

Medicamentos

- 1711 Ácido fólico. Tabletas 0.4 mg, c/90
- 4376 Polivitaminas y minerales. Envase con 30 tabletas
- 3809 Toxoide tetánico. Frasco con 10 dosis
- 2116 Hidralazina. Solución inyectable 10 mg/ ml 5 ampolletas con un ml
- 4201 Hidralazina. Solución inyectable 20 mg 5 ampolletas con un ml
- 570 Hidralazina. Tableta 10 mg c/20 tabletas

Auxiliares de diagnóstico

- Prueba de embarazo (enzimática)
- Prueba de embarazo (inmunológica)
- VDRL
- Química sanguínea
- Biometría hemática
- Grupo sanguíneo y Rh
- Examen general de orina
- Ultrasonido obstétrico
- Perfil TORCH

45. Atención del parto normal y puerperio

Descripción

Incluye la atención del parto desde su llegada a la sala de labor para su preparación, trabajo de parto, nacimiento y alumbramiento por vía vaginal. Incluye todos los insumos de una sala de expulsión hasta la atención de la madre después del parto (puerperio) mediato y consulta de seguimiento.

CIE - 9 -MC

- 73.5 Parto asistido manualmente

CIE - 10

- O80.9 Parto espontáneo
- Z39 Examen y atención del posparto

Normatividad

NOM-007-SSA2-1993, Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio a recién nacidos. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio

Medicamentos

- 3412 Indometacina. Supositorios
- 3407 Naproxeno. Tabletas 275 mg, c/20
- 3417 Diclofenaco. Tabletas 75 mg, c/20
- 1544 Ergometrina (ergonovina) Solución inyectable, 0.2 mg/ ml, 50 ampolletas con 1 ml

Auxiliares de diagnóstico

- Grupo sanguíneo y Rh
- Biometría hemática
- Química sanguínea de 3 elementos
- Tiempo de protombina
- Tiempo de tromboplastina parcial

46. Atención del recién nacido normal

Descripción

Incluye los cuidados inmediatos del recién nacido, la valoración Apgar, Silverman-Andersen, inicio de lactancia materna, profilaxis ocular, aplicación de vitamina K y las primeras inmunizaciones de acuerdo a la Cartilla Nacional del Niño y el Adolescente.

Normatividad

NOM-007-SSA2-1993, Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio a recién nacidos. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio

CIE - 10

Z370 Recién nacido vivo

Medicamento

2821 Cloramfenicol. Solución oftálmica con 15 ml
1732 Vitamina K. Ampolleta 2 mg, 0.2 ml, c/3
3802 Vacuna Sabin. Frasco gotero con 20 dosis
3801 Vacuna BCG. Ampolleta con 10 dosis

47. Cesárea y puerperio quirúrgico

Descripción

La cesárea está indicada en embarazo de alto riesgo o cuando se presentan complicaciones durante el parto que ponen en peligro a la madre y/o el producto. Se realiza con anestesia epidural (bloqueo), pero puede utilizarse anestesia general en caso necesario. Se consideró en promedio una hora y media de quirófano y estancia hospitalaria durante un día y medio, así como una consulta de control y seguimiento.

CIE - 9 -MC

74. Cesárea

CIE - 10

O82.9 Cesárea
Z39 Examen y atención del posparto

Normatividad

NOM-007-SSA2-1993, Atención a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio a recién nacidos. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio

Medicamentos

3407 Naproxeno. Tabletas 275 mg, c/20
3417 Diclofenaco. Tabletas 75 mg, c/20
1544 Ergometrina (ergonovina) Solución inyectable, 0.2 mg/ ml, 50 ampolletas con 1 ml
1954 Gentamicina. Solución inyectable de 80 mg
1955 Gentamicina. Solución inyectable de 20 mg
1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12
1928 Dicloxacilina. Ampolletas 250 mg
1929 Ampicilina Tabletas o cápsulas 500 mg 20 tabletas o cápsulas
1931 Ampicilina Solución inyectable 500 mg Un frasco ampula y diluyente con 2 ml
1921 Penicilina sódica cristalina. Fco. ampula 1 000 000 U
1973 Clindamicina. Solución inyectable 300 mg/ 2 ml. Una ampolleta con 2 ml
2133 Clindamicina. Cápsulas 300 mg 16 cápsulas
1309 Metronidazol. Ampolletas 200 mg
1308 Metronidazol. Tabletas 500 mg, c/30

Auxiliares de diagnóstico

Grupo sanguíneo y Rh
Biometría hemática
Química sanguínea de 3 elementos

Tiempo de protombina
Tiempo de tromboplastina parcial
Ultrasonografía
Tocardiografía

48. Estimulación temprana del prematuro

Descripción

La estimulación temprana del prematuro es crítica para el desarrollo de habilidades. La prematuridad (peso menor a 2500 g) representa el 9% del 1. 4 millones de recién nacidos registrados en el año 2000. Esta intervención está programada en una sesión cada dos semanas durante seis meses a grupos promedio de 5 - 7 niños.

CIE 10

P073 Recién nacido pretérmino

49. Rehabilitación de fracturas

Descripción

Para fracturas no complicadas comprende en promedio 10 sesiones de una hora, tratamiento analgésico y una radiografía para control.

CIE - 9 - MC

93.1 Fisioterapia

Medicamentos

3407 Naproxeno. Tabletas 275 mg, c/20

3417 Diclofenaco. Tabletas 75 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

Rx simple

50. Rehabilitación de parálisis facial

Descripción

La rehabilitación se basa en la aplicación de calor local en la zona afectada, masajes y estimulación con ultrasonido. Se programan dos consultas semanales hasta completar un promedio de 10 sesiones de una hora.

CIE - 10

G510 Parálisis facial

51. Diagnóstico y tratamiento general de las intoxicaciones

Descripción

El diagnóstico es clínico basado en los antecedentes. Pueden tomarse muestras sanguíneas con anticoagulante, orina, contenido gástrico y enviarse a toxicología. Incluye atención en urgencias y consulta de seguimiento. Los auxiliares de diagnóstico dependen del tipo de sustancia. Pueden emplearse biometría hemática, creatinina, nitrógeno ureico, glucemia, general de orina, radiografías y gases arteriales.

CIE - 10

Y471 Efectos adversos de benzodiazepinas

Y493 Efectos adversos de antipsicóticos y neurolépticos fenotiazínicos

T543 Efecto tóxico de sustancias alcaloides

A05 Intoxicación alimentaria bacteriana

A050 Intoxicación alimentaria estafilocócica

Y451 Efectos adversos de salicilatos
T51 Efecto tóxico del alcohol

Medicamentos

572 Metoprolol. Tabletas 100 mg, c/20
405 Difenhidramina. Jarabe 60 ml
406 Difenhidramina. Inyectable 100 mg
2611 Fenitoína. Suspensión 37.5mg/5m
0525 Fenitoína. Tabletas 100 mg, c/50
3231 Clorpromacina. 25 mg tabletas c/50
3232 Clorpromacina. 100 mg tabletas c/100
2707 Ácido ascórbico. Tabletas 100 mg 20 Tabletas
4054 Flumazenil. Solución inyectable 0.5 mg / 5 ml Una ampolleta con 5 ml
2242 Carbón activado Polvo. Envase con 1 kg.

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática
Creatinina en sangre
Glucosa en sangre
Gasometría arterial
Examen general de orina
Glucosa en sangre
Rx de tórax (posteroanterior, anteroposterior o lateral)
Rx abdominal simple (de pie o decúbito)
Detección de metabolitos en orina
Salicilatos en sangre

52. Diagnóstico y tratamiento de intoxicación por organofosforados

Descripción

Los insecticidas organofosforados se utilizan ampliamente en agricultura comercial y jardinería casera. El cuadro clínico incluye síntomas de inhibición de la enzima acetilcolinesterasa: cólico abdominal, diarrea, vómito, salivación excesiva, sudación, lagrimeo, miosis, sibilancias, broncorrea y convulsiones. El tratamiento inicial es lavado gástrico y administración de carbón activado.

CIE - 10

T600 Efecto tóxico de insecticidas organofosforados y carbamatos

Medicamentos

2242 Carbón activado Polvo. Envase con 1 kg.

Auxiliares de diagnóstico

Colinesterasa sérica

53. Diagnóstico y tratamiento de mordedura de serpiente

Descripción

Es una urgencia médica, requiere la inmovilización del miembro afectado, colocando torniquete por arriba del sitio afectado cada 30 minutos, lavado mecánico en el sitio de la mordedura y la aplicación de suero antiofídico diluido en solución salina isotónica. Se realizarán pruebas de coagulación, fibrinógeno y creatinina para evaluar evolución. Para evitar infección en sitio de la herida, se administran antibióticos profilácticos.

CIE - 10

T630 Efecto tóxico del veneno de serpiente

Medicamentos

3843	Suero antiviperino	Fco. ampula 10 ml, unidosis
2510	Penicilina G. Procaínica	Ampolleta 400 000 U
1926	Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg,	c/12
1927	Dicloxacilina. Suspensión	250 mg

Auxiliares de diagnóstico

Creatinina en sangre
Tiempo de protombina
Tiempo de tromboplastina parcial
Gasometría arterial

54. Diagnóstico y tratamiento del alacranismo

Descripción

Ante la certeza o sospecha de picadura de alacrán por cuadro clínico o antecedentes epidemiológicos, deberá aplicarse suero antialacrán en los primeros 30 minutos posteriores a la picadura, considerando que este accidente constituye una verdadera urgencia médica en niños, mujeres embarazadas y ancianos, por el riesgo de complicaciones o muerte en edades extremas de la vida. En áreas endémicas con Alacranismo, en los lactantes el único dato podría ser la aparición súbita de sintomatología respiratoria o neurológica acompañada por llanto intenso. Se deben monitorear signos vitales, mantener una vena canalizada y en su caso, detectar y tratar oportunamente insuficiencia cardiaca o respiratoria, principal causa de muerte. La dosis de suero antialacrán será de acuerdo a la respuesta con un máximo de cinco aplicaciones. Incluye analgésicos para el dolor.

Normatividad

PROY NOM-033-SSA2-2000, Para la vigilancia, prevención y control de la intoxicación por picadura de alacrán

CIE - 10

T632 Efecto tóxico por veneno de escorpión (alacrán)

Medicamentos

105	Paracetamol. Supositorios	300 mg
106	Paracetamol. 100 mg/ml,	frasco 15 ml
108	Metamizol. Tabletas	500 mg, c/20
3417	Diclofenaco	Tabletas 75 mg, c/20
1926	Dicloxacilina. Cápsulas de	250 mg, c/12
3842	Suero antialacrán. Frasco	ampula con 5 ml, unidosis
5079	Clorpiramina. Solución	inyectable 20 mg/2 ml, 5 Ampolletas con 2 ml

55. Manejo de lesiones traumáticas de tejidos blandos

Descripción

Comprende lesiones que no requieren hospitalización y cuya atención deberá ser en el área de urgencias en las primeras cuatro horas para evitar procesos infecciosos. Pueden ser producidas por trauma directo y cortaduras. Incluye tratamiento farmacológico, radiografía simple y consulta de control.

CIE - 10

S01	Herida de la cabeza
S11	Herida del cuello
S21	Herida del tórax
S31	Herida del abdomen, de la región lumbosacra y de la pelvis
S41	Herida del hombro y del brazo
S51	Herida del antebrazo y del codo

- S61 Herida de la muñeca y de la mano
S71 Herida de la cadera y del muslo
S81 Herida de la pierna
S91 Herida del tobillo y del pie

Medicamentos

- 3809 Toxoide tetánico. Fco. ampula con 10 dosis
3417 Diclofenaco. Tabletas 75 mg, c/20
3407 Naproxeno. Tabletas 275 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

- D-10 Rx simple

56. Manejo de mordeduras y prevención de rabia en humanos

Descripción

Atención inmediata a persona expuesta por contacto con animal sospechoso de rabia (perro, gato, murciélago y otros animales silvestres). Se inicia con lavado mecánico en la mordedura y si el estudio clínico epidemiológico es sospechoso o positivo a rabia, aplicación de inmunoglobulina antirrábica en el sitio de la lesión grave y toxoide tetánico. Incluye vacunación en cultivos celulares (VERO, PCEC, 5 dosis, en diferentes días) y vigilancia del perro o gato agresor por 10 días.

Normatividad

NOM-011-SSA2-1993, Para la prevención y control de la rabia

CIE - 10

- W54 Mordedura o ataque de perro

CIE - 9 - MC

- 99.44 Vacunación contra rabia

Medicamentos

- 1924 Penicilina G. Procaínica. Ampolleta 400 000 U
1925 Penicilina G. Benzatínica. Ampolleta 1 200 000 U
1921 Penicilina sódica cristalina. Fco. ampula 1 000 000 U
3809 Toxoide tetánico. Fco. ampula con 10 dosis
1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12
1927 Dicloxacilina. Suspensión 250 mg
3817 Vacuna antirrábica humana en cultivos celulares. Frasco c/2 ml y 300 UI/ml
3833 Inmunoglobulina humana antirrábica. Que contiene 300 UI por ml. Ampula con 2 ml
104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20

Auxiliares de diagnóstico

- Muestra de encéfalo (del animal agresor)

57. Diagnóstico y tratamiento de pielonefritis

Descripción

En el caso de pielonefritis se puede requerir hospitalización hasta por 48 horas para manejo parenteral con antibióticos. Posteriormente se continúa con tratamiento vía oral de 14 a 21 días. Se realiza urocultivo después de tratamiento para el seguimiento. El cuadro clínico se caracteriza por fiebre mayor a 39° C, escalofríos, náuseas, vómito, hipertonia muscular generalizada, malestar general y dolor en fosa lumbar. Generalmente existen infecciones previas en vías urinarias inferiores. El diagnóstico puede apoyarse con urografía excretora, ultrasonido renal y urocultivo.

CIE - 10

- N10 Pielonefritis aguda

Medicamentos

- 1903 Trimetoprim /sulfametoxazol Tabletas 80 mg, c/30

- 1904 Trimetoprim /sulfametoxazol Suspensión 120 ml, (40mg/5 ml)
- 1911 Nitrofurantoína. Furadantina tabletas 100 mg, c/40
- 1939 Cefalexina. Tabletas 500 mg, c/20
- 1954 Gentamicina. Solución inyectable de 80 mg
- 1955 Gentamicina. Solución inyectable de 20 mg
- 4255 Ciprofloxacina. Tabletas 500 mg, c/12

Auxiliares de diagnóstico

Urocultivo
Examen general de orina
Urografía excretora
Ultrasonido renal

58. Diagnóstico y tratamiento de la bronquiolitis

Descripción

La bronquiolitis es de etiología viral por lo que debe manejarse con cuidados generales y medicamentos sintomáticos. Sin embargo, esta intervención requiere de atención en urgencias y hospitalización cuando el paciente presenta datos de insuficiencia respiratoria. El diagnóstico es clínico y se apoya de los análisis comunes de laboratorio y gabinete como radiografía de tórax, gasometría arterial y biometría hemática. El tratamiento está basado en oxígeno y líquidos parenterales.

Normatividad

NOM -031-SSA2-1999 Para la atención a la salud del niño

CIE - 10

J21 Bronquiolitis aguda

Medicamentos

- 106 Paracetamol Suspensión 100 mg/ml
- 1931 Ampicilina Solución inyectable 500 mg Un frasco ampula y diluyente con 2 ml
- 429 Salbutamol. Aerosol 20 mg, c/200 disparos
- 431 Salbutamol. Jarabe 2mg/5ml, frasco 60 ml.

Auxiliares de diagnóstico

Rx de tórax (posteroanterior, anteroposterior o lateral)
Biometría hemática
Gasometría arterial

59. Diagnóstico y tratamiento de meningitis

Descripción

El diagnóstico se sospecha por la presencia de fiebre, irritabilidad, rechazo a la vía oral, vómitos y trastorno del estado de alerta, la exploración presenta signos de irritabilidad e hiperreflexia. Se realiza punción lumbar y estudio de líquido cefalorraquídeo para frotis, citoquímico, cultivo y coagulación, además de química sanguínea, biometría hemática, general de orina, urea y creatinina. El tratamiento es con antibióticos y quince días de hospitalización promedio.

CIE - 10

- G00 Meningitis bacteriana
- G03 Meningitis debida a otras causas

Medicamentos

- 1935 Cefotaxima Ampolleta 1 g, 4 ml
- 4251 Vancomicina. Fco. ampula 500 mg, 10 ml
- 1954 Gentamicina. Solución inyectable de 80 mg
- 1955 Gentamicina. Solución inyectable 20 mg

- 1921 Penicilina sódica cristalina Fco. ampula 1 000 000 U
- 2510 Penicilina G procaínica Ampolleta 400 000 U
- 1956 Amikacina. Ampolleta 500 mg
- 1957 Amikacina. Ampolleta 100 mg
- 1992 Cloramfenicol. Ampolletas 1 g

Auxiliares de diagnóstico

- Biometría hemática
- Urea en sangre
- Electrolitos séricos
- Frotis de líquido cefalorraquídeo
- Cultivo líquido cefalorraquídeo
- Citoquímico de líquido cefalorraquídeo
- Coagulación de líquido cefalorraquídeo
- Examen general de orina
- Creatinina en sangre
- Química sanguínea de 5 elementos
- Electroencefalograma (EEG)
- Tomografía axial computarizada
- Potenciales evocados auditivos y visuales

60. Diagnóstico y tratamiento de neumonía de comunidad en niños

Descripción

Considerada una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, el diagnóstico se basa en la historia clínica, los antecedentes previos al cuadro y la detección de polipnea en la exploración física. Como apoyo de laboratorio se incluye biometría hemática, gasometría arterial, radiografía de tórax y cultivos de expectoración. El tratamiento se basa en oxigenoterapia y manejo con antibióticos, se incluyen varios esquemas de tratamiento. Incluye atención en urgencias, hospitalización promedio por cinco días y consulta de seguimiento.

CIE - 10

- J13 Neumonía debida a Streptococcus pneumoniae
- J14 Neumonía debida a Haemophilus influenzae
- J18 Neumonía no especificada

Medicamentos

- 1930 Ampicilina Suspensión oral 250 mg/ 5 ml Envase con 60 ml
- 1931 Ampicilina Solución inyectable 500 mg Un frasco ampula y diluyente con 2 ml
- 429 Salbutamol. Aerosol 20 mg, c/200 disparos
- 431 Salbutamol. Jarabe 2mg/5ml, frasco 60 ml.
- 1904 Trimetoprim con sulfametoxazol. Suspensión 120 ml, (40mg/5 ml)
- 1972 Eritromicina. Suspensión 125 mg, 120 ml
- 1924 Penicilina G. Procaínica. Ampolleta 400 000 U
- 1925 Penicilina G. Benzatínica. Ampolleta 1 200 000 U
- 1921 Penicilina sódica cristalina. Fco. ampula 1 000 000 U
- 105 Paracetamol. Supositorios 300 mg
- 106 Paracetamol. 100 mg/ml, frasco15 ml
- 1954 Gentamicina. Solución inyectable de 80 mg/2ml
- 1955 Gentamicina. Solución inyectable 20 mg/2ml
- 1935 Cefotaxima . Ampolleta 1 g, 4 ml
- 1956 Amikacina. Ampolleta 500 mg
- 1957 Amikacina. Ampolleta 100 mg

Auxiliares de diagnóstico

- Biometría hemática

Rx de tórax (posteroanterior, anteroposterior o lateral)
Gasometría arterial

61. Diagnóstico y tratamiento de neumonía de comunidad en el adulto mayor

Descripción

Considerada una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, el diagnóstico se basa en la historia clínica, los antecedentes previos al cuadro y la exploración física. Como apoyo de laboratorio se incluye biometría hemática, gasometría arterial, radiografía de tórax y cultivos de expectoración. El tratamiento se basa en oxigenoterapia y manejo con antibióticos, se incluyeron varios esquemas de tratamiento. Incluye atención en urgencias, hospitalización promedio por cinco días y consulta de seguimiento.

CIE - 10

- J13 Neumonía debida a *Streptococcus pneumoniae*
- J14 Neumonía debida a *Haemophilus influenzae*
- J18 Neumonía no especificada

Medicamentos

- 1954 Gentamicina. Solución inyectable de 80 mg/2ml
- 1955 Gentamicina. Solución inyectable 20 mg/2ml
- 1921 Penicilina sódica cristalina. Fco. ampula 1 000 000 U
- 2510 Penicilina G procaínica. Ampolleta 400 000 U
- 1935 Cefotaxima . Ampolleta 1 g, 4 ml
- 1956 Amikacina. Ampolleta 500 mg
- 1957 Amikacina. Ampolleta 100 mg

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática
Rx de tórax (posteroanterior, anteroposterior o lateral)
Cultivo de *Mycoplasma pneumoniae*
Cultivo *Chlamydia pneumoniae*
Gasometría arterial
Química sanguínea de 3 elementos
Cultivo de expectoración
Electrolitos séricos

62. Diagnóstico y tratamiento del absceso hepático amebiano

Descripción

La enfermedad se presenta en dos formas clínicas. El cuadro agudo se caracteriza por fiebre y dolor intenso en hipocondrio derecho, acompañado de hepatomegalia, ictericia y distensión abdominal. La forma crónica presenta febrícula, dolor moderado en el área hepática, hepatomegalia e ictericia. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico, una buena exploración física y en la realización de ultrasonografía hepática, biometría hepática, química sanguínea, electrolitos y pruebas de función hepática. En los casos complicados el tratamiento es quirúrgico.

CIE - 10

- K750 Absceso del hígado

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática
Química sanguínea de 3 elementos
Rx abdominal simple (de pie o decúbiteo)
Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina
Examen general de orina
Transaminasa glutámico oxalacética
Transaminasa glutámico pirúvica
Bilirrubinas en sangre
Ultrasonido de hígado y vías biliares

Medicamentos

1309 Metronidazol. Ampolletas 200 mg
1308 Metronidazol. Tabletas 500 mg, c/30
1305 Dehidroemetina. 5 ampolletas 60 mg/2 ml

63. Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pélvica inflamatoria

Descripción

El cuadro clínico se caracteriza por dolor pélvico asociado con descarga vaginal, sangrado irregular, dismenorrea incapacitante, dispareunia, disuria y fiebre. El diagnóstico es clínico y se requerirá de un ultrasonido pélvico y en algunos casos de laparoscopia pélvica para confirmación. El tratamiento es antibiótico y en ocasiones cirugía.

CIE - 10

N71 Enfermedad inflamatoria pélvica

Medicamentos

1921 Penicilina sódica cristalina. Fco. ampola 1 000 000 U
2510 Penicilina G procaínica. Ampolleta 400 000 U
1935 Cefotaxima. Ampolleta 1 g, 4 ml
1956 Amikacina. Ampolleta 500 mg
1957 Amikacina. Ampolleta 100 mg
1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12
1928 Dicloxacilina. Ampolletas 250 mg
1309 Metronidazol. Ampolletas 200 mg
1308 Metronidazol. Tabletas 500 mg, c/30
4249 Levofloxacino. Ampolleta de 500 mg

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática
Química sanguínea de 3 elementos
Examen general de orina
Ultrasonido pélvico

64. Diagnóstico y tratamiento del aborto incompleto

Descripción

Procedimiento de urgencia indicado en casos de aborto inminente o incompleto. Se realizan exámenes generales de laboratorio como tiempos de sangrado, biometría hemática, química sanguínea, general de orina y grupo sanguíneo. Si la paciente requiere revisión y legrado se evalúa la administración de sangre y antibióticos, se consideraron dos a tres días de hospitalización y consulta de control y seguimiento.

CIE - 9- MC

O 03 Aborto espontáneo
O 06 Aborto no especificado

Medicamentos

1929 Ampicilina Tabletas o cápsulas 500 mg 20 tabletas o cápsulas
1931 Ampicilina Solución inyectable 500 mg Un frasco ampola y diluyente con 2 ml
1921 Penicilina sódica cristalina. Fco. ampola 1 000 000 U

1955	Gentamicina	Solución inyectable 20 mg/2ml
1954	Gentamicina	Solución inyectable de 80 mg/2ml
1926	Dicloxacilina	Cápsulas de 250 mg, c/12
1928	Dicloxacilina	Ampolletas 250 mg
1940	Doxiciclina	Cápsulas de 100 mg, c/10
1308	Metronidazol	Ampolleta 200 mg, 10 ml, c/2
1309	Metronidazol	Ampolletas 200 mg
1308	Metronidazol	Tabletas 500 mg, c/30
3417	Diclofenaco	20 tabletas de 75 mg
1544	Ergometrina (ergonovina)	Solución inyectable, 0.2 mg/ ml, 50 ampolletas con 1 ml

Auxiliares de diagnóstico

Cultivo de micobacterias
Gasometría arterial
Electrolitos séricos
Examen general de orina
Grupo sanguíneo y Rh
Electrocardiograma (ECG)
Ultrasonido pélvico
Química sanguínea de 3 elementos
Tiempo de tromboplastina parcial
Tiempo de protombina
Biometría hemática
VDRL

65. Diagnóstico y tratamiento de la litiasis de vías urinarias

Descripción

El diagnóstico incluye apoyo con biometría hemática, examen general de orina, radiografía simple de abdomen y urografía excretora. Para el tratamiento farmacológico se incluyen antiespasmódicos, analgésicos y antibióticos. El descenso del cálculo a través del uréter puede requerir atención en urgencias para manejo de dolor. En algunos casos es necesario efectuar una ureterotomía. Incluye tres días de hospitalización según la evolución y una consulta de seguimiento. No se incluye litotripsia.

CIE - 10

N20 Cálculo del riñón y del uréter
N21 Cálculo de las vías urinarias inferiores

CIE - 9 - MC

56.2 Ureterotomía

Medicamentos

1954	Gentamicina.	Solución inyectable de 80 mg/2ml
1955	Gentamicina.	Solución inyectable 20 mg/2ml
1206	Butilhioscina.	Tabletas 10 mg, c/20
1207	Butilhioscina.	Ampolleta 20 mg 1 ml, c/3
108	Metamizol sódico (Dipirona).	10 comprimidos 500 mg
109	Metamizol sódico (Dipirona).	Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)
2510	Penicilina G procaínica.	Ampolleta 400 000 U

Auxiliares de diagnóstico

Biometría hemática
Urea en sangre
Electrolitos séricos
Rx abdominal simple (de pie o decúbiteo)
Ultrasonido renal
Urografía excretora

66. Colectomía

Descripción

Intervención en la que deben considerarse antecedentes como dieta alta en grasas, tabaquismo y obesidad, incluye valoración cardiológica y anestésica con estudios de laboratorio además de los exámenes prequirúrgicos en los que se incluyeron ultrasonido y gammagrama o serie gastroduodenal con medio de contraste. El procedimiento incluye en promedio dos días de hospitalización y dos visitas subsiguientes para control y revisión. Puede llevarse a cabo a cielo abierto o bajo laparoscopia.

CIE - 10

K80 Colelitiasis

K81 Colectitis

CIE - 9- MC

51.22 Colectomía abierta

51.23 Colectomía laparoscópica

Medicamentos

1241 Metoclopramida. Tabletas de 10 mg, c/20

3417 Diclofenaco. Tabletas 75 mg, c/20

1234 Ranitidina. Ampolleta 50 mg, 5 ml, c/5

1233 Ranitidina. Tabletas 150 mg

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Biometría hemática

Bilirrubinas en sangre

Electrocardiograma (ECG)

Ultrasonido de hígado y vías biliares

Colangiografía

67. Apendicectomía

Descripción

La apendicitis aguda es la inflamación del apéndice cecal y su resolución es quirúrgica. Debe enviarse inmediatamente a segundo nivel de atención. El tratamiento farmacológico incluye terapia antimicrobiana y analgésicos parenterales.

CIE - 10

K35 Apendicitis aguda

CIE - 9- MC

47.0 Apendicectomía

Medicamentos

1955 Gentamicina. Solución inyectable 20 mg/2ml

1954 Gentamicina . Solución inyectable de 80 mg/2ml

1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12

1928 Dicloxacilina. Ampolletas 250 mg

1309 Metronidazol. Ampolletas 200 mg

1308 Metronidazol . Tabletas 500 mg, c/30

3417 Diclofenaco. 20 tabletas de 75 mg

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

1234 Ranitidina. Ampolleta 50 mg, 5 ml, c/5

Auxiliares de diagnóstico

Tiempo de protombina
Tiempo de tromboplastina parcial
Grupo sanguíneo y RH
Química sanguínea de 3 elementos
Biometría hemática
Rx abdominal simple (de pie o decúbiteo)
Ultrasonido pélvico
Electrocardiograma (ECG)

68. Hernioplastia crural

Descripción

El diagnóstico es principalmente clínico, explorando la región crural. Se realiza valoración cardiológica y anestésica y exámenes prequirúrgicos como tiempos de coagulación, química sanguínea, biometría hemática y electrocardiograma. Para la estimación de costos se consideró en promedio una hora quirófano, dos días hospitalización y red o malla quirúrgica.

CIE - 10

K41 Hernia femoral

CIE - 9- MC

53.0 Reparación de hernia femoral unilateral

53.1 Reparación de hernia femoral bilateral

Medicamentos

1926 Dicloxacilina Cápsulas de 250 mg, c/12

3417 Diclofenaco 20 tabletas de 75 mg

104 Paracetamol Tabletas 500 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Grupo sanguíneo y Rh

Biometría hemática

Electrocardiograma (ECG)

Química sanguínea de 3 elementos

69. Hernioplastia inguinal

Descripción

El diagnóstico es principalmente clínico, explorando la región inguinal. Se realiza valoración cardiológica y anestésica y exámenes prequirúrgicos como tiempos de coagulación, química sanguínea, biometría hemática y electrocardiograma. Para la estimación de costos se consideró en promedio una hora quirófano, dos días hospitalización y red o malla quirúrgica.

CIE - 10

K40 Hernia inguinal

CIE - 9- MC

53.0 Reparación de hernia inguinal unilateral

53.1 Reparación de hernia inguinal bilateral

Medicamentos

1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12

3417 Diclofenaco. 20 tabletas de 75 mg

104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina
Grupo sanguíneo y Rh
Biometría hemática
Electrocardiograma (ECG)
Química sanguínea de 3 elementos

70. Hernioplastia umbilical

Descripción

El diagnóstico es principalmente clínico, explorando la región umbilical. Se realiza valoración cardiológica y anestésica y exámenes prequirúrgicos: tiempos de coagulación, química sanguínea, biometría hemática y electrocardiograma. Para la estimación de costos se consideró la red o malla, una hora quirófano y dos días hospitalización.

CIE - 10

K42 Hernia umbilical

CIE - 9- MC

53.4 Reparación de hernia umbilical

Medicamentos

1926 Dicloxacilina Cápsulas de 250 mg, c/12
3417 Diclofenaco 20 tabletas de 75 mg
104 Paracetamol Tabletas 500 mg, c/20
109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Tiempo de tromboplastina parcial
Tiempo de protombina
Grupo sanguíneo y Rh
Biometría hemática
Electrocardiograma (ECG)
Química sanguínea de 3 elementos

71. Hernioplastia ventral

Descripción

El diagnóstico es principalmente clínico, explorando la región ventral. Se realiza valoración cardiológica y anestésica y exámenes prequirúrgicos: tiempos de coagulación, química sanguínea, biometría hemática y electrocardiograma. Para la estimación de costos se consideró la red o malla, una hora quirófano y dos días hospitalización.

CIE - 10

K43 Hernia ventral

CIE - 9- MC

53.5 Reparación de hernia ventral

Medicamentos

1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12
3417 Diclofenaco. 20 tabletas de 75 mg
104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20
109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Tiempo de tromboplastina parcial
Tiempo de protombina
Grupo sanguíneo y Rh
Biometría hemática
Electrocardiograma (ECG)
Química sanguínea de 3 elementos

72. Diagnóstico y tratamiento del absceso rectal

Descripción

Incluye estudios preoperatorios, esquema de antibióticos y analgésicos y el drenaje quirúrgico del absceso. El procedimiento se considera de corta estancia y no requiere hospitalización.

CIE - 10

K611 Absceso rectal

Medicamentos

1926 Dicloxacilina Cápsulas de 250 mg, c/12
3417 Diclofenaco 20 tabletas de 75 mg
104 Paracetamol Tabletas 500 mg, c/20
109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Tiempo de tromboplastina parcial
Tiempo de protombina
Grupo sanguíneo y Rh
Biometría hemática
Electrocardiograma (ECG)
Química sanguínea de 3 elementos

73. Diagnóstico y tratamiento de fístula y fisura anal

Descripción

Incluye estudios preoperatorios, esquema de antibióticos y analgésicos y el procedimiento de fisurectomía o fistulectomía. Incluye un promedio de dos días de hospitalización.

CIE - 10

K60 Fisura y fístula de las regiones anal y rectal

Medicamentos

1926 Dicloxacilina Cápsulas de 250 mg, c/12
3417 Diclofenaco 20 tabletas de 75 mg
104 Paracetamol Tabletas 500 mg, c/20
109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Tiempo de tromboplastina parcial
Tiempo de protombina
Grupo sanguíneo y Rh
Biometría hemática
Electrocardiograma (ECG)
Química sanguínea de 3 elementos

74. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de miomatosis uterina (miomectomía)

Descripción

Considerada la neoplasia benigna más común del aparato genital femenino, puede cursar asintomática, con hemorragia intensa o dismenorrea. Una buena exploración física e historia clínica acompañado de ultrasonido generalmente conduce al diagnóstico. Conviene enviar a la paciente de inmediato con el especialista si se acompaña de embarazo.

CIE - 10

D259 Leiomioma de útero

Medicamentos

- 1926 Dicloxacilina. Cápsulas de 250 mg, c/12
- 3417 Diclofenaco. 20 tabletas de 75 mg
- 104 Paracetamol. Tabletas 500 mg, c/20
- 109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

- Tiempo de tromboplastina parcial
- Tiempo de protombina
- Grupo sanguíneo y Rh
- Biometría hemática
- Electrocardiograma (ECG)
- Química sanguínea de 3 elementos
- Ultrasonido pélvico

75. Histerectomía

Descripción

La histerectomía esta indicada en la ruptura uterina no reparable, adherencia de la placenta, inercia uterina complicada, útero de Couvelaire, infección puerperal, miomatosis uterina múltiple, carcinoma cérvicouterino, aborto séptico, huevo muerto retenido y embarazo molar. El cuadro clínico varía de acuerdo al padecimiento. Para el diagnóstico se incluyeron: biometría hemática, química sanguínea, general de orina, tiempos de coagulación, grupo sanguíneo, citología cervical (tinción de Papanicolaou), toma de biopsia, antígeno carcinoembrionario, electrocardiograma (ECG), radiografías de tórax y abdomen, ultrasonido, gammagrama, tomografía, histerosalpingografía, resonancia magnética. Se consideraron en promedio cinco días de hospitalización, dos consultas de seguimiento y terapia hormonal sustitutiva en pacientes menores de 50 años de edad.

CIE - 9- MC

- 68.4 Histerectomía total abdominal
- 68.5 Histerectomía vaginal

Medicamentos

- 1206 Butilioscina tabletas 10 mg, c/20
- 1207 Butilioscina ampolleta 20 mg 1 ml, c/3
- 3417 Diclofenaco tabletas 75 mg, c/20
- 3407 Naproxeno tabletas 275 mg, c/20
- 109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)
- 3508 Desogestrel y etinilestradiol. Envase con 28 tabletas
- 3507 Levonorgestrel y etinilestradiol. Envase con 28 tabletas
- 3503 Noretisterona Ampolleta 200 mg
- 3506 Noretisterona y etinilestradiol Envase con 21 tabletas
- 3509 Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol Ampolletas 25 mg

Auxiliares de diagnóstico

- Ultrasonido pélvico
- Perfil hormonal en la mujer
- Electrocardiograma (ECG)
- Biometría hemática
- Química sanguínea de 3 elementos
- Tiempo de protombina
- Tiempo de tromboplastina parcial
- Grupo sanguíneo y Rh

76. Plastía vaginal anterior

Descripción

Procedimiento indicado en casos severos de uretro - cistocele. Incluye una consulta de referencia con el ginecobstetra, estudios preoperatorios, valoraciones pre - anestésica y cardiológica, hospitalización postquirúrgica y una consulta de seguimiento con el especialista.

CIE - 10

N81 Prolapso genital uterino

CIE - 9- MC

70.5 Reparación de cistocele (colporrafia anterior)

Medicamentos

1955 Gentamicina Solución inyectable 20 mg/2ml
 1954 Gentamicina Solución inyectable de 80 mg/2ml
 1926 Dicloxacilina Cápsulas de 250 mg, c/12
 1928 Dicloxacilina Ampolletas 250 mg
 1309 Metronidazol Ampolletas 200 mg
 1308 Metronidazol Tabletas 500 mg, c/30
 1234 Ranitidina Ampolleta 50 mg, 5 ml, c/5
 1924 Penicilina G. Procaínica Ampolleta 400 000 U
 1925 Penicilina G. Benzatínica Ampolleta 1 200 000 U
 3417 Diclofenaco 20 tabletas de 75 mg
 109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Grupo sanguíneo y Rh
 Tiempo de tromboplastina parcial
 Tiempo de protombina
 Química sanguínea de 3 elementos
 Electrocardiograma (ECG)
 Biometría hemática

77. Prostatectomía abierta

Descripción

Procedimiento empleado para extirpar la glándula prostática en los casos de crecimiento no canceroso que se presenta después de los 50 años de edad. El cuadro clínico se caracteriza por dificultad para orinar, poliuria con tenesmo, nicturia y goteo al final de la micción. El diagnóstico se hace con base al cuadro clínico, tacto rectal y antígeno prostático específico para descartar cáncer. El tratamiento quirúrgico incluye dos días de hospitalización y dos consultas de seguimiento.

CIE - 10

N40 Hiperplasia de la próstata

CIE - 9- MC

60.0 Operaciones sobre próstata

Medicamentos

3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20
 3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20
 109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Electrocardiograma (ECG)
 Biometría hemática
 Química sanguínea de 3 elementos
 Tiempo de protombina
 Tiempo de tromboplastina parcial
 Grupo sanguíneo y Rh
 Ultrasonido prostático
 Antígeno prostático específico

78. Resección transuretral de próstata

Descripción

Procedimiento indicado en casos de crecimiento no canceroso de la glándula prostática. El cuadro clínico se caracteriza por dificultad para orinar, poliuria con tenesmo, nicturia y goteo al final de la micción. El diagnóstico se hace con base al cuadro clínico, tacto rectal y antígeno prostático específico para descartar cáncer. El tratamiento quirúrgico incluye resección transuretral (RTU), dos días de hospitalización y dos consultas de seguimiento.

CIE - 10

N 40 Hiperplasia de la próstata

CIE - 9- MC

60.0 Operaciones sobre próstata

Medicamentos

3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20

3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

Química sanguínea de 3 elementos

Tiempo de protombina

Tiempo de tromboplastina parcial

Grupo sanguíneo y Rh

Ultrasonido prostático

Antígeno prostático específico

79. Cirugía de cataratas para uno o ambos ojos

(Con extracción y colocación de lente intraocular)

Descripción

La catarata se presenta con mayor frecuencia en el adulto mayor y en el paciente diabético y es incapacitante. Se deberá referir al segundo nivel de atención para tratamiento quirúrgico. Esta intervención incluye la compra y colocación de lente intraocular. Si es necesario para ambos ojos se dará un intervalo de seis meses para el siguiente procedimiento.

CIE - 10

H25 Catarata senil

H26 Otras cataratas

CIE - 9- MC

13.19 Extracción de catarata

13.7 Extracción de catarata con inserción de cristalino protésico

Medicamentos

4407 Clorhidrato de tetracaína Frasco gotero, 10 ml

2841 Prednisolona colirio Frasco gotero, 5 ml

104 Paracetamol Tabletas 500 mg c/20

106 Paracetamol Suspensión 100 mg/ml

108 Metamizol sódico Tabletas 500 mg, c/20

109 Metamizol sódico Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Electrocardiograma (ECG)

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Biometría hemática

Química sanguínea de 3 elementos

80. Cirugía correctiva de estrabismo

Descripción

Cuando se detecte un problema de estrabismo se deberá referir al segundo nivel de atención, el tratamiento es quirúrgico y consiste en fortalecer o debilitar los músculos. Se incluyen hasta tres tiempos quirúrgicos.

CIE - 10

H49 Estrabismo

CIE - 9- MC

15.21 Operación de alargamiento sobre un músculo extraocular

15.22 Operación de acortamiento sobre un músculo extraocular

Medicamentos

4407 Clorhidrato de tetracaína. Frasco gotero, 10 ml

2841 Prednisolona colirio. Frasco gotero, 5 ml

104 Paracetamol. Tabletas 500 mg c/20

106 Paracetamol. Suspensión 100 mg/ml

108 Metamizol. Tabletas 500 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

81. Resección de pterigión

Descripción

Es un procedimiento oftalmológico indicado en casos específicos de pterigión, principalmente cuando su tamaño obstruye la visión. Se incluye la resección y analgésicos tópicos o sistémicos.

CIE - 10

H 110 Pterigión

Medicamentos

2821 Cloranfenicol Gotas oftálmicas con 15 ml

2822 Cloranfenicol Ungüento oftálmico 5 mg

2823 Neomicina, polimixina B y gramicidina Solución oftálmica 1.75 mg

2841 Prednisolona Solución oftálmica 5 ml

4407 Tetracaína Solución oftálmica 10 ml

2804 Nafazolina Solución oftálmica 15 ml (1mg/ml)

82. Cirugía reconstructiva para labio y paladar hendidos

Descripción

El labio fisurado es un defecto congénito de las estructuras que forman la boca, es una hendidura o separación del labio y/o el paladar. Se debe referir al segundo nivel para recibir tratamiento quirúrgico que se efectúa en varios tiempos.

CIE - 10

Q35 Fisura del paladar

Q36 Labio leporino

Q37 Fisura del paladar con labio leporino

CIE - 9- MC

- 27.6 Palatoplastía
27.54 Reparación de labio fisurado

Medicamentos

- | | | |
|-----|------------------|--|
| 104 | Paracetamol | Tabletas 500 mg c/20 |
| 106 | Paracetamol | Suspensión 100 mg/ml |
| 108 | Metamizol | Tabletas 500 mg, c/20 |
| 109 | Metamizol sódico | Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas) |

Auxiliares de diagnóstico

- Grupo sanguíneo y Rh
Tiempo de tromboplastina parcial
Tiempo de protombina
Química sanguínea de 3 elementos
Electrocardiograma (ECG)
Biometría hemática

83. Diagnóstico y tratamiento de la hipertrofia congénita de píloro

Descripción

El diagnóstico es clínico. Se incluyen estudios preoperatorios, el procedimiento quirúrgico, medicamentos y un promedio hospitalario de cuatro días.

CIE - 10

- Q400 Estenosis hipertrófica congénita del píloro

Medicamentos

- | | | |
|------|---------------------------|--|
| 1955 | Gentamicina | Solución inyectable 20 mg/2ml |
| 1928 | Dicloxacilina | Ampolletas 250 mg |
| 1234 | Ranitidina | Ampolleta 50 mg, 5 ml, c/5 |
| 1924 | Penicilina G. Procaínica | Ampolleta 400 000 U |
| 1925 | Penicilina G. Benzatínica | Ampolleta 1 200 000 U |
| 3417 | Diclofenaco | 20 tabletas de 75 mg |
| 109 | Metamizol sódico | Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas) |

Auxiliares de diagnóstico

- Grupo sanguíneo y Rh
Tiempo de tromboplastina parcial
Tiempo de protombina
Química sanguínea de 3 elementos
Electrocardiograma (ECG)
Biometría hemática
Esofagograma
Manometría esofágica
pHmetría

84. Diagnóstico y tratamiento quirúrgico del pie equino

Descripción

El tratamiento inicial podría ser no quirúrgico con ejercicios de estiramiento y yesos correctores. Un 20% de los casos tratados con este método son corregidos. El resto de los pacientes amerita algún tipo de cirugía después de los 4 meses de edad, desde el alargamiento de los tendones flexores del pie y reparación de la cápsula articular hasta osteotomía desrotatoria. La corrección puede requerir una o varias intervenciones quirúrgicas. Incluye medicamentos, estudios de laboratorio y gabinete y un

promedio de tres a cuatro días de hospitalización después de la cirugía. PROY-NOM-034-SSA2-2000, para la prevención y control de los defectos al nacimiento.

CIE - 10

Q660 Pie equino

Medicamentos

104 Paracetamol Tabletas 500 mg c/20

106 Paracetamol Suspensión 100 mg/ml

108 Metamizol Tabletas 500 mg, c/20

109 Metamizol sódico Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

85. Diagnóstico y tratamiento de la luxación congénita de cadera

Descripción

Incluye el diagnóstico clínico por un especialista, radiografía de la articulación y ejercicios de rehabilitación por 6 meses. En algunos casos es necesario iniciar un procedimiento quirúrgico en uno a tres tiempos quirúrgicos dependiendo de cada caso.

CIE - 10

Q65 Deformidades congénitas de la cadera

Medicamentos

104 Paracetamol Tabletas 500 mg c/20

106 Paracetamol Suspensión 100 mg/ml

108 Metamizol Tabletas 500 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

Rx de cadera

Sesiones de rehabilitación

6 meses

86. Diagnóstico y tratamiento de esguinces en extremidades

Descripción

Incluye estudio radiográfico de la articulación, manejo con analgésicos, antiinflamatorios locales y sistémicos, vendaje o férula según el caso, radiografía de control si es necesario y dos consultas de seguimiento. En caso de requerir anestesia el procedimiento quedará a cargo del especialista.

CIE - 10

S836 Esguince y torcedura de la rodilla

S637 Esguince y torcedura de muñeca y mano

- S534 Esguince y torcedura del codo
- S434 Esguince y torcedura de la articulación del hombro
- S934 Esguince y torcedura del tobillo y pie

Medicamentos

- 3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20
- 3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20
- 109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

- Rx hombro (dos proyecciones)
- Rx codo (dos proyecciones)
- Rx muñeca o carpo (dos proyecciones)
- Rx pelvis (dos proyecciones)
- Rx rodilla (dos proyecciones)
- Rx tobillo o tarso (dos proyecciones)

87. Diagnóstico y tratamiento de fractura de clavícula

Descripción

En esta intervención se incluye radiografía simple. Dentro del tratamiento se incluye la reducción de la fractura, el vendaje o Velpeaux y la administración de analgésicos y antiinflamatorios. Incluye dos consultas de seguimiento y radiografía de control si es necesario.

CIE - 10

- S420 Fractura de la clavícula

Medicamentos

- 3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20
- 3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20
- 109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

- Rx hombro (dos proyecciones)
- Grupo sanguíneo y Rh
- Tiempo de tromboplastina parcial
- Tiempo de protombina
- Química sanguínea de 3 elementos
- Electrocardiograma (ECG)
- Biometría hemática

88. Diagnóstico y tratamiento de fractura de húmero

Descripción

El diagnóstico se realiza en base a la historia del trauma y presencia de dolor, deformidad de la región e incapacidad funcional. A la exploración física hay aumento de volumen, espasmo muscular y ocasionalmente equimosis. Se incluye placa radiográfica simple en dos proyecciones. El tratamiento no quirúrgico (85% de los casos) incluye la reducción de la fractura por manipulación externa, seguido de inmovilización con molde de yeso o plástico, seguimiento a las cuatro semanas, estudio radiográfico de control, retiro de yeso y dos visitas de seguimiento. Ante la necesidad de tratamiento quirúrgico que requiera material de osteosíntesis, se le darán los primeros auxilios, se estabilizará al paciente y se hospitalizará e inmovilizará el miembro afectado mientras se programa para cirugía. Requiere un promedio de tres días de estancia hospitalaria. Esta intervención incluye radiología (tres estudios radiológicos en dos proyecciones), material de osteosíntesis, medicamentos, tres días estancia postoperatoria y tres visitas de seguimiento.

CIE - 10

- S422 Fractura de epífisis superior de húmero
- S423 Fractura de diáfisis de húmero

S424 Fractura de epífisis inferior de húmero

Medicamentos

3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20

3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Rx brazo (dos proyecciones)

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

89. Diagnóstico y tratamiento fracturas de cúbito y radio

(Con osteosíntesis)

Descripción

El diagnóstico se realiza en base a la historia del trauma y presencia de dolor, deformidad de la región e incapacidad funcional. A la exploración física hay aumento de volumen, tumefacción, espasmo muscular y ocasionalmente equimosis. Se incluye placa radiográfica simple en dos proyecciones. El tratamiento no quirúrgico incluye la reducción de la fractura por manipulación externa, seguido de inmovilización con molde de yeso o plástico, seguimiento a los diez días, estudio radiográfico de control, retiro de yeso y dos visitas de seguimiento. Ante la necesidad de tratamiento quirúrgico que requiera material de osteosíntesis, se le darán los primeros auxilios, se estabilizará al paciente y se hospitalizará e inmovilizará el miembro afectado mientras se programa para cirugía. Esta intervención incluye radiología (tres estudios radiológicos en dos proyecciones), material de osteosíntesis, medicamentos, tres días estancia postoperatoria, tres visitas de seguimiento y rehabilitación.

CIE - 10

S52 Fractura del antebrazo

Medicamentos

3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20

3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Rx cúbito y radio (dos proyecciones)

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

90. Diagnóstico y tratamiento fracturas de tibia y peroné

(Con osteosíntesis)

Descripción

El diagnóstico se realiza en base a la historia del trauma y presencia de dolor, deformidad de la región e incapacidad funcional. A la exploración física hay aumento de volumen, espasmo muscular y ocasionalmente equimosis. Se incluye placa radiográfica simple en dos proyecciones. El tratamiento no quirúrgico incluye la reducción de la fractura por manipulación externa, seguido de inmovilización con molde de yeso o plástico, seguimiento a las seis semanas, estudio radiográfico de control y retiro de yeso. Ante la necesidad de tratamiento quirúrgico que requiera material de osteosíntesis, se le darán los

primeros auxilios, se estabilizará al paciente y se hospitalizará e inmovilizará el miembro afectado mientras se programa para cirugía. Esta intervención incluye radiología (tres estudios radiológicos en dos proyecciones), material de osteosíntesis, medicamentos, tres días estancia postoperatoria y tres visitas de seguimiento.

CIE - 10

S82 Fractura de la pierna

Medicamentos

3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20

3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Rx tibia y peroné (dos proyecciones)

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

91. Diagnóstico y tratamiento fracturas diafisiarias de fémur

(Con osteosíntesis)

Descripción

En el adulto aproximadamente el 85% de este tipo de fracturas es quirúrgica. El manejo inicial es la estabilización del paciente, inmovilización del segmento afectado con férula pelvipodálica, mitigar el dolor y programar para osteosíntesis (placas y clavos). Puede emplearse material de sustitución, de compresión o intramedular. Esta intervención incluye radiología (tres estudios radiológicos en dos proyecciones), material de osteosíntesis, medicamentos, tres a cuatro días estancia postoperatoria y tres visitas de seguimiento.

CIE - 10

S72 Fractura de fémur

Medicamentos

3417 Diclofenaco Tabletas 75 mg, c/20

3407 Naproxeno Tabletas 275 mg, c/20

109 Metamizol sódico. Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)

Auxiliares de diagnóstico

Rx fémur (dos proyecciones)

Grupo sanguíneo y Rh

Tiempo de tromboplastina parcial

Tiempo de protombina

Química sanguínea de 3 elementos

Electrocardiograma (ECG)

Biometría hemática

LISTADO DE CLAVES DE MEDICAMENTOS

(Clasificados de acuerdo a los grupos establecidos por el Consejo de Salubridad General)

GRUPO	NIVEL	NOMBRE GENERICO	PRESENTACION	CLAVE	NUM	
Analgesia	1	Acido acetilsalicílico	20 tabletas 500 mg	101	1	
		Metamizol sódico (Dipirona)	10 comprimidos 500 mg	108	2	
			Solución inyectable 1 g/2 ml (Caja con 3 ampolletas)	109	3	
			Paracetamol (Acetaminofén)	10 tabletas 500 mg	104	4
		3 supositorios 300 mg	105	5		
			Solución oral con 15 ml (100 mg/ml)	106	6	
	2	Capsaicina	Crema con 40 g (0.035 g)	4031	7	
Cardiología	1	Captopril	30 tabletas 25 mg	574	8	
		Clortalidona	20 tabletas 50 mg	561	9	
		Epinefrina (Adrenalina)	50 ampolletas 1 mg/ml (1:1 000)	611	10	
		Metoprolol	20 tabletas 100 mg	572	11	
		Propranolol	30 tabletas 40 mg	530	12	
	2	Candesartán cilixetilo/hidroclorotiazida	28 tabletas 16.0 mg/12.5 mg	2530	13	
			Hidralazina	20 tabletas 10 mg	570	14
				5 ampolletas 10 mg/ml	2116	15
		5 ampolletas 20 mg/ml	4201	16		
		Irbesartán/hidroclorotiazida	Tabletas 150/12.5 mg	4097	17	
			Tabletas 300/25 mg	4098	18	
		Losartán potásico/hidroclorotiazida	15 tabletas 50 mg/12.5 mg	2521	19	
		Nifedipino	20 cápsulas de gelatina blanda 10 mg	597	20	
		Dermatología	1	Aceite de almendras dulces, lanolina, glicerina, propilenglicol, sorbitol	Crema 235 ml	910
Bencilo	Emulsión dérmica 120 ml (300 mg/ml)			861	22	
Clíoquinol (Yodoclorohidroxiquinoleína)	Crema 20 g (30 mg/g)			872	23	
Isoconazol	Crema 20 g (1 g/100 g)			2024	24	
Lindano	Shampoo 120 ml (1 g/100 ml)			911	25	
Miconazol	Crema 20 g (20 mg/g)			891	26	

		Nitrofurazona	Pomada 85 ó 436 g (2 mg/g)	874	27
		Oxido de zinc (Lassar)	Pasta 30 g (25 g/100 g)	804	28
Endocrinología	1	Glibenclamida	50 tabletas 5 mg	1042	29
		Insulina humana acción intermedia NPH	Frasco ampula 10 ml (100 UI/ml)	1050	30
		Insulina humana de acción intermedia lenta	Frasco ampula 10 ml (100 UI/ml)	4157	31
		Prednisona	20 tabletas 5 mg	472	32
	2	Acarbosa	30 tabletas 50 mg	5166	33
		Calcio	12 comprimidos 500 mg	1006	34
		Insulina glargina	Frasco ampula 10 ml (100 UI/ml)	4158	35
		Insulina humana acción rápida regular	Frasco ampula 10 ml (100 UI/ml)	1051	36
		Levotiroxina (Levotiroxina sódica)	100 tabletas 100 µg	1007	37
		Metformina	30 tabletas 850 mg	5165	38
		Tiamazol (metimazol)	20 tabletas 5 mg	1022	39
Enf Infecciosas	1	Albendazol	2 Tabletas 200 mg	1344	40
			Suspensión oral 20 ml (20 mg/ml)	1345	41
		Amoxicilina	12 ó 15 cápsulas 500 mg	2128	42
			Suspensión oral 75 ml (250 mg/5 ml)	2127	43
		Ampicilina	20 tabletas o cápsulas 500 mg	1929	44
			Solución inyectable 2 ml (500 mg)	1931	45
			Suspensión oral 60 ml (250 mg/5 ml)	1930	46
		Bencilpenicilina procaína	Suspensión inyectable 2,400,000 UI	2510	47
		Bencilpenicilina sódica cristalina	Solución inyectable 1,000,000 UI	1921	48
		Bencilpenicilina procaínica/bencilpenicilina cristalina	Suspensión inyectable 300,000 UI/100,000 UI	1923	49
		Bencilpenicilina procaínica/bencilpenicilina cristalina	Suspensión inyectable 600,000 UI/200,000 UI	1924	50
		Bencilpenicilina benzatínica compuesta	Susp Inyec. Benzatínica 600,000 UI Procaínica 300,000 UI Sódica 300,000 UI	1938	51
		Benzatina bencilpenicilina	Suspensión inyectable 1,200,000 UI	1925	52
		Cefalexina	20 cápsulas o tabletas 500 mg	1939	53
		Cloramfenicol	Suspensión oral 65 ml (31.25 mg/ml)	5260	54
Dicloxacilina	20 cápsulas o comprimidos 500 mg	1926	55		

		Suspensión inyectable 5 ml (250 mg)	1928	56
		Suspensión oral 60 ml (250 mg/5 ml)	1927	57
		Doxiciclina	10 cápsulas o tabletas 100 mg	1940 58
		Eritromicina	20 cápsulas o tabletas 250 mg	1971 59
			Suspensión oral 100 ml (250 mg/5 ml)	1972 60
		Gentamicina	Solución inyectable 2 ml (20 mg)	1955 61
			Solución inyectable 2 ml (80 mg)	1954 62
		Mebendazol	6 tabletas 100 mg	2136 63
		Metronidazol	20 ó 30 tabletas 500 mg	1308 64
			Suspensión oral 120 ml (250 mg/5 ml)	1310 65
		Nitrofurantoina	40 Cápsulas 100 mg	1911 66
		Pirantel	6 tabletas 250 mg	2138 67
		Trimetoprima/sulfametoxazol	20 tabletas 80 mg/400 mg	1903 68
			Suspensión oral 120 ml (40 mg/200 mg en 5 ml)	1904 69
	2	Amikacina	Solución inyectable 2 ml (100 mg)	1957 70
			Solución inyectable 2 ml (500 mg)	1956 71
		Amoxicilina/ácido clavulánico	Suspensión oral 60 ml (125 mg/5 ml)	2129 72
		Cefotaxima	Solución inyectable 4 ml (1 g)	1935 73
		Ciprofloxacino	8 tabletas o cápsulas 250 mg	4255 74
		Claritromicina	10 tabletas 250 mg	2132 75
		Clindamicina	16 cápsulas 300 mg	2133 76
			Solución inyectable 2 ml (300 mg)	1973 77
		Cloramfenicol	Solución inyectable 5 ml (1 g)	1992 78
		Dehidroemetina	Solución inyectable 60 mg/2 ml (caja con 5 ampolletas)	1305 79
		Itraconazol	15 cápsulas 100 mg	2018 80
		Levofloxacino	Ampolleta 500 mg	4249 81
		Metronidazol	2 ampolletas 10 ml (200 mg/10 ml)	1309 82
		Vancomicina	Solución inyectable 500 mg	4251 83
Enf Inmuno Alérgicas	1	Clorfenamina (Clorfeniramina)	Jarabe 60 ml (0.5 mg/ml)	408 84
		Cloropiramina	Solución inyectable 2 ml (20 mg/2 ml)	5079 85
		Cromoglicato de sodio	Suspensión aerosol 16 g (112 inhalaciones 3.6 g/100 g)	464 86
		Difenhidramina	Jarabe 60 ml (12.5 mg/5 ml)	405 87
			Solución inyectable 10 ml (100 mg/10 ml)	406 88
	2	Betametasona	Solución inyectable 1 ml (4 mg/ml)	2141 89
		Ketotifeno	Solución oral 120 ml (20 mg/100 ml)	463 90
		Loratadina	20 tabletas o grageas 10 mg	2144 91
	Jarabe 60 ml (5 mg/5 ml)		2145 92	

Gastro Enterología	1	Aluminio y magnesio	50 Tabletas masticables 200/200 ó 447.3 mg	1223	93	
			Suspensión oral 240 ml (185/200 ó 447.3 mg)	1224	94	
		Bismuto subsalicilato de	Suspensión oral 240 ml (1,750 g/100 ml)	1263	95	
		Butilhioscina	10 grageas 10 mg	1206	96	
			Solución inyectable 3 amp 1 ml (20 mg/ml)	1207	97	
		Cisaprida	30 tabletas 5 mg	1209	98	
		Metoclopramida	Solución inyectable 6 amp con 2 ml (10 mg)	1241	99	
		Ranitidina	20 tabletas o grageas 150 mg	1233	100	
		2	Omeprazol	7 ó 14 cápsulas ó tabletas 20 mg	5180	101
			Ranitidina	Solución inyectable 5 amp 2 ó 5 ml (50 mg)	1234	102
Ginecología y Obstetricia	1	Estrógenos conjugados de origen equino	42 grageas o tabletas 0.625 mg	1501	103	
		Metronidazol	10 óvulos o tabletas vaginales 500 mg	1561	104	
		Nistatina	12 óvulos o tabletas vaginales 100,000 UI	1566	105	
		Nitrofurazona	6 óvulos 6 mg	1562	106	
		2	Ergometrina (ergonovina)	Solución inyectable 50 amp con un ml 0.2 mg/ml	1544	107
			Estrógenos conjugados de origen equino	42 Grageas 1,250 mg	1502	108
Hematología	1	Fitomenadiona	Solución inyectable 3 amp 0.2 ml (2 mg)	1732	110	
		Fumarato ferroso	50 Tabletas 200 mg	1701	111	
			Suspensión oral 120 ml (29 mg/ml)	1702	112	
	2	Acido fólico	20 tabletas 5 mg	1706	113	
Intoxicación	1	Atropina	Solución inyectable 1 mg/ml c/50 amp	204	114	
		Carbón activado	Polvo 1 kg	2242	115	
	2	Flumazenil	Solución inyectable 5 ml (0.5 mg)	4054	116	
Nefrología y Urología	1	Hidroclorotiazida	20 tabletas 25 mg	2301	117	
Neumología	1	Aminofilina	Solución inyectable 5 amp 5 ml (250 mg/10 ml)	426	118	
		Beclometasona dipropionato de	Aerosol 200 dosis 50 µg (0.0587 g/100 g)	477	119	
		Salbutamol	Jarabe 60 ml (2 mg/5 ml)	431	120	
			Suspensión aerosol 200 dosis (20 mg)	429	121	
	2	Ipratropio	Aerosol 300 dosis 15 ml (20 µg/nebulización)	2162	122	
		Montelukast	14 tabletas 5 mg	4329	123	
		Salbutamol	Solución para respiradores 10 ml (0.5 g/100 ml)	439	124	

		Teofilina	Elixir 450 ml (533 mg/100 ml)	5075	125	
		Zafirlukast	28 tabletas 20 mg	4331	126	
Neurología	1	Carbamazepina	20 tabletas 200 mg	2608	127	
			Suspensión oral 120 ml (100 mg/5 ml)	2609	128	
	2	Fenitoína (Difenilhidantoína)	Suspensión oral 120 ml (37.5 mg/5 ml)	2611	129	
			Fenitoína sódica	50 tabletas 100 mg	525	130
			Fenobarbital	20 tabletas 100 mg	2601	131
Nutriología	1	Acido ascórbico	20 tabletas 100 mg	2707	132	
			Polivitaminas y Minerales	30 tabletas, grageas o cápsulas	4376	133
	2	Vitamina A	40 cápsulas 50,000 UI	2191	134	
Oftalmología	1	Cloramfenicol	Solución oftálmica 15 ml (5 mg/ml)	2821	135	
			Ungüento oftálmico 5 g (5 mg/g)	2822	136	
		Nafazolina	Solución oftálmica 15 ml (1 mg/ml)	2804	137	
		Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica 15 ml (75 mg/5,000 U/25 µg por ml)	2823	138	
	2	Prednisolona	Solución oftálmica 5 ml (5 mg/ml)	2841	139	
			Tetracaína	Solución oftálmica 10 ml (5 mg/ml)	4407	140
Otorrino Laringología	1	Difenidol	30 tabletas 25 mg	3111	141	
			Solución inyectable 2 amp 2 ml (40 mg/2 ml)	3112	142	
Planificación Familiar	1	Desogestrel y etinilestradiol	28 tabletas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) 0.15 mg/0.03 mg	3508	143	
			Levonorgestrel y etinilestradiol	28 Grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) 0.15 mg/0.03 mg	3507	144
			Medroxiprogesterona y cipionato de estradiol	Suspensión inyectable 0.5 ml (25 mg/5 mg por 0.5 ml)	3509	145
	2	Noretisterona	Solución inyectable 1 ml (200 mg/ml)	3503	146	
			Noretisterona y etinilestradiol	28 tabletas o grageas (21 con hormonales y 7 sin hormonales) 0.400 mg/0.035 mg	3506	147
Psiquiatría	2	Cloropromazina	20 comprimidos 100 mg	3232	148	
			50 comprimidos 25 mg	3231	149	
Reumatología	1	Acido acetilsalicílico	20 grageas o tabletas con capa entérica 500 mg	3401	150	
			Alopurinol	20 tabletas 300 mg	3451	151
			Celecoxib	10 cápsulas 200 mg	5506	152
			Colchicina	30 tabletas 1 mg	3409	153
			Diclofenaco	20 cápsulas o grageas 100 mg	3417	154
			Naproxeno	30 tabletas 250 mg	3407	155
	2	Azatioprina	50 tabletas 50 mg	3461	156	
			Indometacina	30 tabletas 25 mg	3413	157

Soluciones	1	Electrolitos orales	Polvo para solución 27.9 g (Glucosa 20 g/KCl 1.5 g NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g)	3623	158
Vacunas, Toxoides, Inmunoglob y Antitoxinas	1	Inmunoglobulina humana antirrábica	Ampula 2 ml (300 UI/ml)	3833	159
		Suero antialacrán	Frasco ampula 5 ml (unidosis)	3842	160
		Suero antiviperino	Frasco ampula 10 ml (unidosis)	3843	161
		Toxoide tetánico	Frasco ampula con 10 dosis	3809	162
		Vacuna antirrábica humana en cultivos celulares	Frasco 2 ml (300 UI/ml)	3817	163
		Vacuna BCG	Ampolleta 10 dosis y solución salina como diluyente	3801	164
		Vacuna pentavalente	Frasco ampula DPT - HB 0.5 ml y Frasco ampula vacuna liofilizada (unidosis)	3823	165
		Vacuna Sabin	Frasco gotero con 20 dosis 2 ml	3802	166
		Vacuna Td (tétanos y difteria)	Frasco 5 ml 10 dosis	3810	167
		Vacuna triple viral SRP	Frasco de vacuna liofilizada (unidosis)	3820	168