

**(6) Mortalidad por enfermedades diarreicas
en menores de 5 años ^{1/}**

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
Nacional	19,65	15,83	17,78
Aguascalientes	9,12	7,58	8,37
Baja California	8,39	14,68	11,46
Baja California Sur	8,44	4,47	6,52
Campeche	17,81	5,33	11,71
Coahuila	9,85	4,30	7,14
Colima	15,17	3,94	9,67
Chiapas	46,27	42,99	44,66
Chihuahua	11,51	12,09	11,79
Distrito Federal	13,21	8,93	11,11
Durango	8,97	5,34	7,19
Guanajuato	15,77	16,88	16,31
Guerrero	20,00	16,83	18,45
Hidalgo	12,08	3,60	7,93
Jalisco	11,46	9,46	10,48
México	31,85	25,48	28,74
Michoacán	20,03	8,96	14,61
Morelos	12,50	15,64	14,04
Nayarit	6,32	19,84	12,92
Nuevo León	6,12	2,13	4,17
Oaxaca	38,79	27,35	33,19
Puebla	34,71	27,53	31,19
Querétaro	15,15	15,79	15,46
Quintana Roo	9,10	15,26	12,11
San Luis Potosí	16,78	14,91	15,86
Sinaloa	6,10	3,99	5,07
Sonora	10,89	7,90	9,43
Tabasco	25,63	16,47	21,15
Tamaulipas	6,74	6,35	6,55
Tlaxcala	30,77	18,00	24,51
Veracruz	18,01	16,30	17,17
Yucatán	13,14	8,75	10,99
Zacatecas	19,30	10,03	14,76

^{1/} Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad.

Fuente: Base de mortalidad INEGI-SSA, 2004 y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO 2002.