

(20) Mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años ^{1/}

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
Nacional	16,85	3,07	9,89
Aguascalientes	14,07	3,82	8,69
Baja California	33,61	6,66	20,42
Baja California Sur	23,30	5,00	14,47
Campeche	17,18	3,56	10,49
Coahuila	12,67	2,29	7,53
Colima	15,55	6,66	11,10
Chiapas	17,27	1,96	9,62
Chihuahua	21,37	2,69	12,23
Distrito Federal	21,64	2,86	12,02
Durango	11,58	1,34	6,38
Guanajuato	9,97	1,32	5,42
Guerrero	24,65	6,89	15,61
Hidalgo	5,87	1,73	3,73
Jalisco	17,56	3,08	10,22
México	9,73	1,80	5,74
Michoacán	8,36	1,82	4,94
Morelos	15,49	3,89	9,63
Nayarit	13,85	4,28	9,13
Nuevo León	15,31	3,08	9,27
Oaxaca	15,11	4,10	9,39
Puebla	18,96	2,55	10,53
Querétaro	5,55	1,24	3,36
Quintana Roo	30,94	5,78	18,86
San Luis Potosí	8,17	0,89	4,43
Sinaloa	13,66	3,22	8,53
Sonora	14,44	2,38	8,53
Tabasco	27,82	5,81	16,86
Tamaulipas	17,03	2,77	9,98
Tlaxcala	3,86	1,87	2,85
Veracruz	31,91	6,67	19,07
Yucatán	23,42	2,66	13,08
Zacatecas	6,38	1,44	3,79

^{1/}Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad.

Fuente: Base de mortalidad INEGI-SSA, 2004 y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO 2002.