

(7) Mortalidad por infecciones respiratorias en menores de 5 años ^{1/}

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
Nacional	33,23	28,44	30,88
Aguascalientes	20,41	13,51	17,02
Baja California	18,28	20,69	19,46
Baja California Sur	8,46	13,44	10,88
Campeche	7,75	16,23	11,89
Coahuila	11,69	14,01	12,82
Colima	19,09	3,97	11,67
Chiapas	31,03	27,90	29,50
Chihuahua	30,06	30,28	30,17
Distrito Federal	41,50	31,90	36,79
Durango	3,96	8,25	6,06
Guanajuato	15,09	20,23	17,61
Guerrero	11,48	8,40	9,97
Hidalgo	27,22	24,75	26,01
Jalisco	20,04	18,70	19,39
México	83,46	62,63	73,27
Michoacán	16,68	14,34	15,53
Morelos	13,93	10,56	12,28
Nayarit	6,42	6,73	6,57
Nuevo León	7,24	9,74	8,46
Oaxaca	31,56	30,70	31,14
Puebla	73,93	69,85	71,94
Querétaro	29,36	19,95	24,75
Quintana Roo	5,42	15,14	10,17
San Luis Potosí	27,99	15,55	21,91
Sinaloa	8,57	9,80	9,17
Sonora	23,78	15,14	19,56
Tabasco	21,91	22,89	22,39
Tamaulipas	12,91	9,95	11,47
Tlaxcala	61,95	48,31	55,26
Veracruz	30,40	26,94	28,71
Yucatán	14,40	8,79	11,66
Zacatecas	22,69	22,12	22,41

^{1/} Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad.

Fuente: Cifras preliminares del Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones 2005 (SEED 2005); Dirección General de Información en Salud (DGIS), SSA, y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002.