

(20) Mortalidad por SIDA en población de 25 a 44 años ^{1/}

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
Nacional	16,62	3,13	9,80
Aguascalientes	15,12	1,87	8,17
Baja California	30,89	5,62	18,53
Baja California Sur	24,84	1,22	13,46
Campeche	10,86	2,60	6,80
Coahuila	10,74	1,50	6,17
Colima	24,02	2,18	13,09
Chiapas	17,10	5,07	11,09
Chihuahua	19,67	3,20	11,62
Distrito Federal	21,91	1,60	11,51
Durango	14,18	3,09	8,54
Guanajuato	10,34	1,82	5,86
Guerrero	20,19	7,03	13,49
Hidalgo	6,08	2,55	4,25
Jalisco	17,18	3,03	10,00
México	10,29	1,38	5,81
Michoacán	9,65	0,98	5,11
Morelos	16,05	4,59	10,26
Nayarit	24,50	2,10	13,46
Nuevo León	13,05	1,72	7,46
Oaxaca	23,67	4,83	13,88
Puebla	12,75	4,11	8,32
Querétaro	7,88	2,00	4,89
Quintana Roo	28,62	4,98	17,27
San Luis Potosí	9,28	1,76	5,42
Sinaloa	14,15	1,46	7,91
Sonora	16,14	2,33	9,38
Tabasco	24,08	6,30	15,22
Tamaulipas	13,97	3,68	8,89
Tlaxcala	8,14	3,03	5,54
Veracruz	33,73	8,00	20,62
Yucatán	13,61	5,20	9,43
Zacatecas	8,41	0,95	4,50

^{1/}Tasa de mortalidad observada por 100,000 habitantes de ese grupo de edad.

Fuentes: Cifras preliminares del Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones 2005 (SEED 2005); Dirección General de Información en Salud (DGIS), SSA, y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO, 2002.