

**(22) Prevalencia de ITS/VIH-SIDA en población
de 15 a 24 años ^{1/}**

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
Nacional	10,02	9,63	9,83
Aguascalientes	3,81	0,00	1,91
Baja California	19,00	42,76	30,60
Baja California Sur	24,18	19,60	21,98
Campeche	21,18	18,13	19,68
Coahuila	11,25	13,43	12,32
Colima	21,94	29,04	25,47
Chiapas	11,83	9,81	10,84
Chihuahua	14,56	32,66	23,41
Distrito Federal	23,11	6,08	14,63
Durango	3,80	0,64	2,23
Guanajuato	2,34	2,88	2,61
Guerrero	9,18	14,06	11,61
Hidalgo	7,49	3,35	5,43
Jalisco	5,14	5,37	5,25
México	2,05	0,63	1,35
Michoacán	6,12	5,41	5,77
Morelos	7,27	7,26	7,27
Nayarit	28,68	31,60	30,12
Nuevo León	8,45	5,31	6,91
Oaxaca	9,50	7,38	8,45
Puebla	4,16	2,12	3,15
Querétaro	5,37	3,04	4,21
Quintana Roo	11,21	84,06	46,17
San Luis Potosí	7,78	6,23	7,01
Sinaloa	17,24	10,42	13,89
Sonora	10,22	15,04	12,58
Tabasco	11,82	9,29	10,57
Tamaulipas	25,90	24,37	25,15
Tlaxcala	5,37	2,75	4,08
Veracruz	12,61	12,05	12,33
Yucatán	19,75	8,41	14,14
Zacatecas	3,55	4,18	3,87

^{1/} Tasas por 100,000 habitantes de 15-24 años de edad. Únicamente se incluyen los casos de Infección Genitourinaria, Sífilis Adquirida e Infección por VIH.

Fuente: Información Epidemiológica de Morbilidad 2001 y 2005. Dirección General de Epidemiología, SSA.