

(22) Prevalencia de ITS/VIH/SIDA en población de 15 a 24 años de edad ^{1/}

Entidad federativa	Hombres	Mujeres	Total
E. U. M	10.02	9.63	9.83
Aguascalientes	3.81	0.00	1.91
Baja California	19.00	42.76	30.60
Baja California Sur	24.18	19.60	21.98
Campeche	21.18	18.13	19.68
Coahuila	11.25	13.43	12.32
Colima	21.94	29.04	25.47
Chiapas	11.83	9.81	10.84
Chihuahua	14.56	32.66	23.41
Distrito Federal	23.11	6.08	14.63
Durango	3.80	0.64	2.23
Guanajuato	2.34	2.88	2.61
Guerrero	9.18	14.06	11.61
Hidalgo	7.49	3.35	5.43
Jalisco	5.14	5.37	5.25
México	2.05	0.63	1.35
Michoacán	6.12	5.41	5.77
Morelos	7.27	7.26	7.27
Nayarit	28.68	31.60	30.12
Nuevo León	8.45	5.31	6.91
Oaxaca	9.50	7.38	8.45
Puebla	4.16	2.12	3.15
Queretaro	5.37	3.04	4.21
Quintana Roo	11.21	84.06	46.17
San Luis Potosí	7.78	6.23	7.01
Sinaloa	17.24	10.42	13.89
Sonora	10.22	15.04	12.58
Tabasco	11.82	9.29	10.57
Tamaulipas	25.90	24.37	25.15
Tlaxcala	5.37	2.75	4.08
Veracruz	12.61	12.05	12.33
Yucatán	19.75	8.41	14.14
Zacatecas	3.55	4.18	3.87

1/ Tasa por 100,000 habitantes de 15-24 años de edad. Únicamente se incluyen los casos de Infección Genitourinaria, Sífilis Adquirida e Infectados por VIH. Fuente: Información Epidemiológica de Morbilidad 2005, Dirección General de Epidemiología, SS. Proyecciones de Población 2000-2050 del CONAPO, 2002.