

(32) % de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito ^{1/}

Entidad federativa	Total
E. U. M	115.48
Aguascalientes	100.74
Baja California	129.40
Baja California Sur	109.81
Campeche	111.55
Coahuila	293.80
Colima	272.22
Chiapas	33.76
Chihuahua	44.26
Distrito Federal	92.45
Durango	107.34
Guanajuato	134.98
Guerrero	136.31
Hidalgo	161.59
Jalisco	77.44
México	149.99
Michoacán	141.12
Morelos	168.64
Nayarit	107.69
Nuevo León	64.13
Oaxaca	127.57
Puebla	130.51
Queretaro	122.30
Quintana Roo	102.68
San Luis Potosí	129.41
Sinaloa	86.42
Sonora	101.23
Tabasco	112.95
Tamaulipas	95.34
Tlaxcala	131.79
Veracruz	128.98
Yucatán	90.42
Zacatecas	122.08

1/ Información para la SS. Entidades con porcentajes mayores a 100 incluyen tamizajes a recién nacidos de otras instituciones de salud. Tamizajes realizados con papel filtro. En este año no se realizaron pruebas rápidas. Recién nacidos dentro y fuera de las unidades de salud. Fuente: Informe de Laboratorios Central y Estatales de Tamiz Neonatal, Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Sistema de Información en Salud (SIS), DGIS/SS, validados por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.