

**(15) Mortalidad por cirrosis hepática, según sexo b/**

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
<b>Nacional</b>	<b>33,41</b>	<b>10,22</b>	<b>21,77</b>
Aguascalientes	19,28	3,19	11,04
Baja California	28,76	5,96	17,53
Baja California Sur	19,10	4,54	11,99
Campeche	36,56	12,61	24,75
Coahuila	23,99	8,11	16,10
Colima	30,91	8,92	19,94
Chiapas	30,45	11,08	20,88
Chihuahua	28,73	6,72	17,97
Distrito Federal	32,00	11,75	21,66
Durango	17,98	6,40	12,17
Guanajuato	29,05	7,57	18,04
Guerrero	21,90	5,78	13,80
Hidalgo	55,66	18,00	36,53
Jalisco	27,38	7,99	17,63
México	39,20	12,37	25,79
Michoacán	26,34	6,97	16,48
Morelos	34,08	14,35	24,24
Nayarit	16,12	6,46	11,34
Nuevo León	17,62	6,79	12,24
Oaxaca	48,34	11,55	29,67
Puebla	63,43	16,88	39,86
Querétaro	47,71	12,18	29,83
Quintana Roo	26,05	7,27	17,06
San Luis Potosí	24,24	5,70	14,85
Sinaloa	13,22	4,64	8,99
Sonora	19,45	6,89	13,27
Tabasco	20,56	8,08	14,36
Tamaulipas	19,87	7,21	13,58
Tlaxcala	40,14	15,41	27,68
Veracruz	54,06	13,69	33,75
Yucatán	40,22	25,18	32,69
Zacatecas	16,29	4,86	10,45

b/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes de ese grupo de edad.

Fuente: Base de mortalidad INEGI-SSA y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO 2002.