

**(6) Mortalidad por enfermedades  
diarreicas en menores de 5 años según sexo b/**

Entidad Federativa	Hombres	Mujeres	Total
<b>Nacional</b>	<b>23,30</b>	<b>18,06</b>	<b>20,73</b>
Aguascalientes	10,29	8,93	9,62
Baja California	9,55	10,72	10,12
Baja California Sur	25,12	13,21	19,32
Campeche	2,41	15,14	8,64
Coahuila	13,20	11,37	12,31
Colima	21,62	3,75	12,87
Chiapas	59,81	50,67	55,34
Chihuahua	19,66	15,13	17,44
Distrito Federal	10,81	9,27	10,06
Durango	3,51	1,22	2,39
Guanajuato	29,29	19,79	24,65
Guerrero	13,95	12,48	13,23
Hidalgo	16,80	8,35	12,67
Jalisco	13,78	12,62	13,21
México	34,18	26,88	30,61
Michoacán	16,42	11,72	14,12
Morelos	11,79	12,30	12,04
Nayarit	11,88	12,41	12,14
Nuevo León	4,93	4,63	4,78
Oaxaca	46,25	38,69	42,55
Puebla	50,01	30,80	40,61
Querétaro	19,20	20,01	19,59
Quintana Roo	20,07	20,99	20,52
San Luis Potosí	23,73	16,26	20,08
Sinaloa	3,55	3,71	3,63
Sonora	22,49	11,76	17,24
Tabasco	16,73	15,52	16,14
Tamaulipas	11,78	5,47	8,70
Tlaxcala	23,79	20,96	22,40
Veracruz	23,32	17,18	20,31
Yucatán	21,80	16,77	19,34
Zacatecas	11,33	10,49	10,92

b/ Tasa de mortalidad observada por 100 000 habitantes de ese grupo de edad.

Fuente: Base de mortalidad INEGI-SSA y proyecciones de población 2000-2050 del CONAPO 2002.