

(32) % de recién nacidos tamizados para detección oportuna de hipotiroidismo congénito b/

Entidad Federativa	
Nacional	122.31
Aguascalientes	117.79
Baja California	199.26
Baja California Sur	101.68
Campeche	122.12
Coahuila	187.60
Colima	101.63
Chiapas	98.58
Chihuahua	79.64
Distrito Federal	109.60
Durango	137.79
Guanajuato	138.01
Guerrero	89.71
Hidalgo	150.19
Jalisco	82.59
México	167.16
Michoacán	120.00
Morelos	137.26
Nayarit	175.44
Nuevo León	127.33
Oaxaca	103.05
Puebla	111.74
Querétaro	112.11
Quintana Roo	100.11
San Luis Potosí	131.05
Sinaloa	55.11
Sonora	128.60
Tabasco	72.99
Tamaulipas	103.80
Tlaxcala	119.98
Veracruz	148.85
Yucatán	109.79
Zacatecas	162.59

b/ Información para la SSA.

Los porcentajes mayores al 100% en algunas entidades se debe al hecho de que incluyen tamizajes a recién nacidos de otras instituciones de salud.

Fuente: Informes estatales 2003. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud (SPPS), SSA.